



12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Алгебра

Рабочая

тетрадь

8

Алгебра

Рабочая тетрадь

8

класс

Пособие для учащихся
общеобразовательных
учреждений

6-е издание

Москва
«Просвещение»
2010

УДК 373.167.1:512
ББК 22.14я72
Р13

Авторы: Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров, М. В. Ткачёва,
Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин

Рабочая тетрадь является частью учебного комплекта по алгебре, включающего
учебник «Алгебра, 8» авторов Ш. А. Алимова и др.

ISBN 978-5-09-023913-4

© Издательство «Просвещение», 2001
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2001
Все права защищены

Рабочая тетрадь

Предисловие

Данная рабочая тетрадь является дополнением к учебнику «Алгебра, 8» авторов Ш. А. Алимова и др. Содержание тетради организовано в соответствии с главами и параграфами этого учебника.

Тетрадь предназначена в основном для работы учащихся с ее помощью в классе. Следует иметь в виду, что рабочая тетрадь не заменяет ни живого слова учителя, ни текста учебника. Она дополняет и то и другое, расширяя арсенал учебных средств учащихся и возможности работы учителя.

Структурно материал каждого параграфа тетради расположен по трем разделам. После I раздела, который предназначен для подготовки школьников к изучению нового материала соответствующего параграфа книги, проведена черта. Эта черта символически обозначает раздел, который не имеет номера, поскольку после выполнения заданий I раздела учитель приступает к объяснению нового материала так, как он считает нужным. Проведя объяснение, учитель работает с учащимися над упражнениями учебника; при этом ученики записывают решение традиционно — у доски или в обычной тетради.

Следующий раздел обозначен как второй — это основной раздел в рабочей тетради, он содержит упражнения, дополнительные к упражнениям учебника. Некоторые из упражнений тетради являются подготовительными к выполнению упражнений учебника, некоторые помогают слабым учащимся в усвоении определенных алгоритмов благодаря увеличению от задания к заданию доли самостоятельной работы школьников. Наиболее трудные упражнения раздела отмечены знаком *.

В последнем разделе, обозначенном цифрой III, приведены тексты упражнений, позволяющих проверить уровень усвоения материала рассматриваемого параграфа. Учитель может выборочно использовать их для проверки качества домашней работы учащихся.

I глава

Неравенства

Положительные и отрицательные числа

§ 1

I

- 1 Заполнить пропуски в предложении:
Рациональными числами называют числа ,

где m — , n — число.

Примеры: ; ; ; ;

- 2 Из чисел $-5,8; 0; \frac{4}{11}; -7; 19; -\frac{18}{9}; 1; -13,5; 2,4; -12\frac{1}{2}; \frac{15}{5}$ выписать:

1) натуральные 2) целые

3) положительные 4) отрицательные

5) рациональные

- 3 Вычислить устно и записать ответ:

1) $\frac{2}{3} - 1\frac{1}{3} =$ 2) $-3\frac{1}{5} + \frac{16}{5} =$

3) $2,03 \cdot (-4) =$ 4) $(-5) \cdot (-1,4) =$

5) $(-1,6) : (-0,8) =$ 6) $4,5 : (-3) =$

- 4 Даны числа $-1; 0,1; -\frac{3}{8}; 4\frac{1}{5}; -2\frac{3}{4}; a-b; \frac{a}{b}$. Записать числа:

1) противоположные данным


2) обратные данным

II

- 5 На числовой оси отметить:

1) точки: $A(-2,5); B(3,5); C\left(-\frac{3}{4}\right);$

- 2) точку D (.....), лежащую на единицу левее точки A ;
- 3) точку E (.....), лежащую на единицу правее точки B ;
- 4) точку F (.....), лежащую посередине между точками A и B .



6 Записать числа $-2,3; 0; -4; -2,35; 2,3; -2,03$ в порядке возрастания.

7 Записать числа $0; -6; \frac{1}{15}; -\frac{4}{9}; -\frac{1}{3}; -\frac{11}{9}; \frac{2}{5}$ в порядке убывания.

8 Записать два рациональных числа, заключенные между двумя данными рациональными числами:

- 1) 5 и 7; 2) -9 и -8 ;
- 3) 0 и 0,6; 4) $-0,4$ и 0;
- 5) $\frac{4}{7}$ и $\frac{6}{7}$; 6) $-0,1$ и $0,1$;

9 Не выполняя вычислений, поставить в пустой клетке знак $>$ или $<$ так, чтобы получилось верное неравенство:

- 1) $(-2,7)^2 \cdot (0,56)^3$ 0; 2) $-(2,7)^2 \cdot (5,6)^3$ 0;
- 3) $-\left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(-\frac{1}{2}\right)^5$ 0; 4) $-\left(\frac{1}{2}\right)^4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^5$ 0.

10 Проставить в клетке знак $>$ или $<$ так, чтобы при $x = -1$ получилось верное неравенство:

- 1) $\frac{x+2}{2}$ $\frac{x-2}{2}$; 2) $\frac{x+2}{x}$ $\frac{x-2}{x}$;
- 3) $\frac{x+1}{x-3}$ $\frac{x+4}{x-3}$; 4) $\frac{5-x}{-x}$ $\frac{2(x+1)}{x+7}$.

11 Разложить на множители:

- 1) $9x - x^2 =$ 2) $7x^2 + 5x =$
- 3) $\frac{1}{4} - x^2 =$ 4) $\frac{x^2}{16} - 1 =$
- 5) $x^3 - 36x =$ 6) $49x - 4x^3 =$

12 Решить уравнение, заполняя пропуски:

- 1) $8x + 11x^2 = 0$; 2) $\frac{2x-5}{x-2} = 0$;

► $x = \dots = 0$, $x - \dots = 0$, $\left\{ \begin{array}{l} x = \dots = 0, \\ x = \dots \end{array} \right.$

Если $x = \dots$, то $x - \dots = \dots \neq 0$.

Ответ. $x_1 = \dots$, $x_2 = \dots$.

Ответ. $x = \dots$.

3)* $9x^3 - x = 0$;

► $x(\dots)(\dots) = 0$,

$x = \dots$, или $\dots = 0$, или $\dots = 0$, т. е.

$x = \dots$, или $x = \dots$, или $x = \dots$.

Ответ. $x_1 = \dots$; $x_2 = \dots$; $x_3 = \dots$.

13 Определить знак числа a так, чтобы было верным неравенство:

1) $\left(-\frac{2}{3}\right)a \cdot (-1,7) \cdot (-3,5)^2 < 0$, $a \boxed{} 0$;

2) $(-7)^3 \cdot \left(-\frac{1}{14}\right)a \cdot 9 > 0$, $a \boxed{} 0$.

14 Доказать, что при любом значении a отрицательно значение выражения:

1) $\frac{6}{a^2+7} - 1 = \dots$

2) $\frac{a^2+3}{a^2+4} - 1 = \dots$

III

15 Заполнить пропуски в предложениях.

1) Если произведение двух чисел — положительное число, то эти числа имеют знаки.

2) Если произведение двух чисел — отрицательное число, то эти числа имеют знаки.

3) Если частное двух чисел — положительное число, то эти числа имеют знаки.

4) Если частное двух чисел — отрицательное число, то эти числа имеют знаки.

16 Записать все целые числа, которые расположены на числовой оси между числами $-\frac{7}{3}$ и $\frac{7}{3}$.

17 Проставить в клетке знак $>$ или $<$ так, чтобы при $x = -1$ получилось верное неравенство:

1) $7(2x - 9) \square 0;$

2) $3(-2x + 1) \square 0.$

18 Решить уравнение, заполнив пропуски:

1) $(6 - 5x)(3x + 4) = 0,$

2) $\frac{4x+3}{7-x} = 0,$

► = 0, $x = \dots$ = 0, $\neq 0,$
..... = 0, $x = \dots$ = =

Если $x = \dots$, то

Ответ. $x_1 = \dots, x_2 = \dots.$

Ответ. $x = \dots.$

3) $\frac{4-x^2}{x-2} = 0,$

4) $3x^2 - 2x = 0.$

► = 0, $\neq 0,$ = 0, $x = \dots$ или =

..... = 0 или = 0, =

$x = \dots, x = \dots.$

$x = \dots$

Если $x = \dots$, то = 0.

Если $x = \dots$, то $\neq 0.$

Ответ.

Ответ.

Числовые неравенства



2

(I)

1 Проставить в клетке знак $>$, $<$ или $=$:

1) $\frac{8}{17} \square \frac{5}{17};$

2) $\frac{4}{9} \square \frac{4}{7};$

3) $2\frac{5}{6} \square 2\frac{7}{12};$

4) $4\frac{1}{3} \square 0;$

5) $1,43 \square 1,45;$

6) $4,072 \square 4,027;$

7) $\frac{16}{5} \square 3,2;$

8) $2\frac{3}{11} \square -3\frac{4}{11};$

9) $0 \square -10,5.$

2 Даны числа: $0,1; -20; 0; -\frac{2}{7}; -1,9; 0,09; -1.$ Расположить их в порядке возрастания и соединить знаком неравенства.

3 Поставить знак $>$ или $<$ между числами m и n :

1) если $m = 1,2$, $n = -3$, то $m \square n$;

2) если $m = 7$, $n = 1$, то $m \square n$;

3) если $m = a$, $n = a + 1$, то $m \square n$;

4) если $m = a^2$, $n = a^2 - 3$, то $m \square n$.

4 Выполнить действия:

1) $(a+2)^2 = \dots + \dots + \dots$ 2) $(1-3x)^2 = \dots - \dots + \dots$

3) $(2+5a)(2-5a) = \dots$ 4) $(6+b)(b-6) = \dots$

5 Привести к общему знаменателю дроби:

1) $\frac{1}{n+1}$ и $\frac{2}{n-1}$;

2) $\frac{1}{b-2}$ и $\frac{a}{(b-2)^2}$;

3) $\frac{1}{m^2-1}$ и $\frac{3}{m-1}$;

4) $\frac{5a}{a^2-4a+4}$ и $\frac{7}{a-2}$.

II

6 С помощью определения числового неравенства сравнить числа:

1) $\frac{11}{25}$ и $0,53$; 2) $0,7$ и $\frac{2}{3}$; 3) $0,9$ и $-\frac{5}{6}$; 4) $-2,4$ и $-\frac{13}{5}$.

1) $\frac{11}{25} = \dots$; $\dots - 0,53 = \dots$. Так как $\frac{11}{25} - 0,53 \square 0$,
то $\frac{11}{25} \square 0,53$.

2) $0,7 = \dots$; $\dots - \frac{2}{3} = \dots = \dots$. Так как $0,7 - \frac{2}{3} \square 0$, то
 $0,7 \square \frac{2}{3}$.

3)

4)

7 Заполнить таблицу:

Значение $m-n$	-3	12	0				a^2+4	$-a^2-9$
Сравнение m и n	$m < n$			$m = n$	$m > n$	$m < n$		

8 Доказать, что $a + \frac{1}{a} < 1$, если $a < 0$.

► Разность $\dots = \dots$ 0, так как при $a < 0$ числитель дроби $\dots \square 0$ (сумма трех положительных чисел \dots), а знаменатель дроби $\dots \square 0$ (по условию). Следовательно, $a + \frac{1}{a} < 1$. ◀

9 Доказать, что $\frac{2}{m-1} > \frac{2}{m+1}$, если $m > 1$.

► Разность $\dots = \dots = \dots \square 0$, так как числитель этой дроби \dots число и знаменатель этой дроби \dots число (по условию $m > 1$). Следовательно, $\frac{2}{m-1} > \frac{2}{m+1}$. ◀

10 Доказать, что $a + \frac{1}{a} < -2$, если $a < 0$ и $a \neq -1$.

► Найдем разность $\dots = a^2 + 2a + 1 = \dots$
Дробь $\dots < 0$, так как $(a+1)^2 \square 0$ при $a \neq -1$ и по условию \dots . Следовательно, $a + \frac{1}{a} < -2$. ◀

Число, кратное 5, можно записать в виде $5k$, где k — натуральное число.

11* Определить, какое из двух чисел больше, если известно, что каждое из них больше 104 и меньше 113, причем первое число кратно 15, второе кратно 8.

► Первое число кратно 15, поэтому запишем его в виде \dots где m — натуральное число. Второе число, кратное 8, запишем в виде \dots , где n — натуральное число.

По условию двойное неравенство $104 < \dots < 113$ верно только при $m = \dots$. Неравенство $104 < \dots < 113$ верно только при $n = \dots$. Поэтому $15m = \dots = \dots$, $8n = \dots = \dots$.

Ответ. Первое число \dots второго. ◀

12* Пусть a и b — натуральные числа, причем $b \neq 1$. Сравнить числа a и b , если верно неравенство $\frac{a}{b} > \frac{a-1}{b-1}$.

Так как $\frac{a}{b} > \frac{a-1}{b-1}$ — верное неравенство, то разность $\frac{a}{b} - \frac{a-1}{b-1} =$
 $= \dots = \dots = \dots$ — положительное число.

Знаменатель этой дроби $\dots > 0$, так как и \dots , и \dots ($b > 1$). Следовательно, числитель этой дроби должен быть \dots числом. Поэтому $\dots > 0$. А это означает, что $b > a$. 

III

13 Заполнить таблицу:

Значение $a - b$	$2\frac{1}{3}$			0		
Сравнение a и b	$a > b$	$0,8 < 1$	$7,6 > 3,5$		$-6 < -1$	$-2,3 > -3,7$

14 Доказать, что при любых значениях a верно неравенство:

1) $(2+a)(a+5) < (a+3)(a+4)$; 2) $(3-a)^2 > a(a-6)$.

Решение:

1) $(2+a)(a+5) - (a+3)(a+4) = 2a + 10 + a^2 + 5a - (a^2 + 7a + 12) = 2a + 10 - 12 = 2a - 2 = 2(a-1)$.
Поскольку a — любое действительное число, то $a-1$ — тоже любое действительное число. Поэтому произведение $2(a-1)$ — положительное число, т. е. $2(a-1) > 0$.
Поэтому $(2+a)(a+5) < (a+3)(a+4)$.

2) $(3-a)^2 - a(a-6) = 9 - 6a + a^2 - a^2 + 6a = 9 > 0$.
Поэтому $(3-a)^2 > a(a-6)$.



15 Доказать утверждения:

- 1) если $a > b$ и $c > d$, то $(a-b)(c-d) > 0$;
- 2) если $a > b$ и $c < d$, то $(a-b)(c-d) < 0$.

Решение:

1) Если $a > b$, то $a-b \square 0$; если $c > d$, то $c-d \square 0$.
Поэтому произведение \dots положительное число, т. е.
 $\dots > 0$.

2) Если $a > b$, то $a-b \square 0$; если $c < d$, то $c-d \square 0$.
Поэтому \dots



Основные свойства числовых неравенств

§

3

I

1 Выяснить, положительное или отрицательное число a :

- 1) если $2,3a < 0$, то $a \boxed{<} 0$; 2) если $6,5a > 0$, то $a \boxed{>} 0$;
3) если $-35a < 0$, то $a \boxed{>} 0$; 4) если $-42a > 0$, то $a \boxed{<} 0$;
5) если $-9a > 0$, то $a \boxed{<} 0$; 6) если $\frac{a}{3} > 0$, то $a \boxed{>} 0$.

2 Выяснить, положительно или отрицательно произведение $(m - 2)(n - 3)$, если:

- 1) $m > 2$ и $n > 3$; 2) $m > 2$, а $n < 3$.

► 1) Если $m > 2$, то $m - 2 \boxed{>} 0$; если $n > 3$, то $n - 3 \boxed{>} 0$. Следовательно, $(m - 2)(n - 3) \boxed{>} 0$.

2) Если $m > 2$, то ; если $n < 3$, то Следовательно,

3 Выяснить, положительна или отрицательна сумма $(m - 2) + (n - 3)$, если:

- 1) $m > 2$ и $n > 3$; 2) $m < 2$ и $n < 3$.

► 1) Если $m > 2$, то ; если $n > 3$, то

Следовательно, $(m - 2) + (n - 3) \boxed{>} 0$.

2) Если $m < 2$, то ; если $n < 3$, то

Следовательно, $(m - 2) + (n - 3) \boxed{<} 0$.

4 Сторона квадрата равна 6 см. Периметр квадрата равен

5 Периметр квадрата равен 48 см. Сторона квадрата равна

II

6 Заполнить таблицы (после выполнения преобразований).

1) Прибавить к обеим частям неравенства данное число:

Исходное неравенство	Данное число	Полученное неравенство
$11 > 3$	5	$16 > 8$
$-3 < 10$	3	
$-7 < -1$	10	
$9 > 2$	-12	
$a + 3 > a$	-10	

2) Прибавить к обеим частям исходного неравенства данное число:

Исходное неравенство	Данное число	Полученное неравенство
$14 + 3b > 2$	$-3b$	$14 > 2 - 3b$
$16 - 5b < 1$	$5b$	
$7a - 8 > 3$	$-7a$	
$16 - 5b < 1$	$-2b$	
$7a - 8 > 3$	$-4a$	

3) Умножить обе части исходного неравенства на данное число:

Исходное неравенство	Данное число	Полученное неравенство
$4 > -3$	2	$8 > -6$
$2 < 5$	-1	
$12 > -8$	-2	
$10 < 16$	$\frac{1}{2}$	
$a > 3$	$a > 0$	$a^2 > 3a$
$b < -8$	$b < 0$	
$b - 2 > 1$	$b > 0$	

4) Разделить обе части исходного неравенства на данное число:

Исходное неравенство	Данное число	Полученное неравенство
$8 < 10$	2	$4 < 5$
$13 > 11$	-1	
$-9 < -6$	-3	
$-4 < -1$	$\frac{1}{2}$	
$16a < 14$	-2	$-8a > -7$
$a > -2a^2$	$a > 0$	
$a < a^2$	$a < 0$	

7 Доказать утверждения.

1) Если $5a - 3 < 4a - 2$,
то $a < 1$.

2) Если $7b + 9 > 6b + 10$,
то $b > 1$.

3) Если $(b - 1)(b + 6) > b(b + 4)$,
то $b > 6$.

4) Если $a(5 + a) < (a + 2)^2$,
то $a < 4$.

8 Доказать, что если $a < b$ и $c < 0$, то $ac > bc$.

По условию $a - b \square 0$ и $c \square 0$. Поэтому $(a - b)c \square 0$, т. е.
 $ac - bc \square 0$. Следовательно, $ac > bc$.

9 Доказать, что если $ac < bc$ и $c > 0$, то $a < b$.

По условию $ac - bc \square 0$, $c(a - b) \square 0$ и $c \square 0$. Поэтому $a - b \square 0$.
Следовательно, $a < b$.

10 Заполнить пропуски.

1) Если сторона квадрата a такова, что $3,1 < a < 3,2$, то его периметр P таков: $< P <$

2) Если периметр квадрата P таков, что $60 < P < 64$, то его сторона a такова: $< a <$

11 Определить знак числа a , если:

1) $9a < 2a$;

2) $-10a > -12a$.

Ответ. $a \square 0$.

Ответ. $a \square 0$.

III

12 Прибавить к обеим частям исходного неравенства число m :

1) $a < b, m = 12$; 2) $a > b, m = -7$;

3) $a > b, m = 20$; 4) $a < b, m = 0,5$;

13 Вычесть из обеих частей исходного неравенства число k :

1) $-3 < 0, k = -1$; 2) $7 > 4, k = 8$;

14 Пусть $a < b$. Проставить в клетке знак $>$ или $<$ так, чтобы получилось верное неравенство:

1) $-4a \square -4b$; 2) $0,5a \square 0,5b$; 3) $\frac{a}{-7} \square \frac{b}{-7}$;

4) $a(c^2 + 2) \square b(c^2 + 2)$; 5) $a(-5 - c^2) \square b(-5 - c^2)$.

15 Доказать, что если $8 - 6a < 12 - 7a$, то $a < 4$.

Сложение и умножение неравенств

§ 4

I

1 Известно, что $a > 3, b > 5$. Доказать, что: 1) $a + b > 8$; 2) $ab > 15$.

1) Если $a > 3$, то $\square 0$. Если $b > 5$, то Сумма двух положительных чисел $(a - 3)$ и $(b - 5)$, т. е. $(a - 3) + (b - 5) \square 0$ или $a - 3 + b - 5 \square 0$, $a + b - 8 \square 0$. Откуда \square .

2) Если $a > 3$, то Если $b > 5$, то Чтобы доказать, что $ab > 15$, нужно убедиться в том, что $\square 0$. Рассмотрим разность $ab - 15$ и преобразуем ее:

$ab - 15 = ab - 3b + 3b - 15 = (ab - 3b) + (3b - 15) = b (\dots - \dots) +$
 $+ 3(\dots - \dots) > 0$, так как $b \dots 0$, $(a - 3) \dots 0$, $3 > 0$ и $\dots \dots 0$.
 Следовательно, $ab > 15$. ◀

2 Заполнить пропуск в предложении:

Сумма двух сторон треугольника всегда третьей стороны.

3 Каким может быть число a — длина одной из сторон треугольника, если две другие его стороны равны 3 ед. и 5 ед.?

По свойству треугольника $a < \dots + \dots$, т. е. $a < \dots$.

С другой стороны, $a + 3 > \dots$, т. е. $a > \dots$. Итак, $\dots < a < \dots$. ◀

II

4 Сложить почленно неравенства:

1) $12 > 1$ и $1 > -3$;

2) $-9 < 2$ и $5 < 8$;

3) $-8 < -3$ и $-2 < 6$;

4) $0 > -5$ и $4 > -2$;

5) $a - 3 > 6 + b$ и $7 - 2a > 4 - b$;

6) $a + 1 < 2b - 3$ и $8 - 2a < 5 - 4b$.

5 Доказать, что диагональ выпуклого четырехугольника $ABCD$ меньше его полупериметра.

Рассмотрим, например, диагональ $BD = m$.


Из $\triangle ABD$ следует, что $m < \dots + \dots$.

Из $\triangle BCD$ следует, что $m < \dots + \dots$.

Складывая полученные неравенства, запишем:

$\dots < \dots + \dots + \dots + \dots$, откуда

$m < \dots$. ◀



6 Длина прямоугольника больше 9 дм, а ширина больше 4 дм. Доказать, что периметр этого прямоугольника больше 29 дм.

▶ Пусть a — длина прямоугольника, b — его ширина, тогда $a > 9$, $b > 4$, откуда $a + b > \dots$, а периметр прямоугольника $2(a + b) > \dots$ ◀

7 Выполнить умножение неравенств:

1) $8 > 5$ и $3 > 2$, 2) $12 < 18$ и $\frac{1}{6} < \frac{1}{3}$,
3) $24 > 10$ и $0,2 > 0,1$, 4) $a > 2$ и $b > 6$,

8 Одна из сторон прямоугольника a больше 2 ед., но меньше 5 ед.; другая сторона b больше 3 ед., но меньше 10 ед. Каким числом квадратных единиц может быть площадь этого прямоугольника?

▶ По условию $2 < a < 5$ и $3 < b < 10$. Выполним умножение неравенств (по условию задачи a и b — положительные числа):

$a < 5$ и $b < 10$, получим $ab < \dots$.

$a > \dots$ и $b > \dots$, получим $ab > \dots$.

Но ab — площадь прямоугольника, поэтому $\dots < ab < \dots$ ◀

9 Известно, что a и b — положительные числа. Доказать, что:

1) если $a^2 > b^2$, то $a > b$; 2) если $a^3 < b^3$, то $a < b$.

▶ 1) Если $a^2 > b^2$, то $a^2 - b^2 > 0$ или $(a - b)(a + b) > 0$.
 $a + b > 0$, так как $a > 0$ и $b > 0$, но тогда $a - b > 0$, т. е. $a > b$.
2) Если $a^3 < b^3$, то $a^3 - b^3 < 0$ или $(a - b)(a^2 + ab + b^2) < 0$.
 $a^2 + ab + b^2 > 0$, так как $a^2 > 0$, $ab > 0$, $b^2 > 0$, но тогда $a - b < 0$, т. е. $a < b$. ◀

10 Доказать, что если $a > 1$ и $b > 3$, то:

1) $5a + 3b > 14$; 2) $4ab + 6 > 18$;

3) $(a + b)^2 > 16$; 4) $a^2 + b^2 > 10$.

▶ 1) $a > 1$, $5a > \dots$; $b > 3$, $3b > \dots$; $5a + 3b > \dots$;

2) $a > \dots$, $b > \dots$, $ab > \dots$; $4ab > \dots$;

$4ab + 6 > \dots$;

3) $a > \dots$, $b > \dots$, $a + b > \dots$; $(a + b)^2 > \dots$;

4) $a > \dots$, $b > \dots$; $a^2 > \dots$, $b^2 > \dots$;

$a^2 + b^2 > \dots$. ◀

(III)

- 11** Выполнить сложение неравенств:
- 1) $15 < 19$ и $-5 < 2$, 2) $4 > -3$ и $6 > 3$,
 - 3) $a - 5b > 1 + 2a$ и $3a + b > 8 - 2a$,
 - 4) $2a - 9b < a + 11$ и $3a + 11b < b - a$,
- 12** Выполнить умножение неравенств:
- 1) $4 < 5$ и $7 < 9$, 2) $12 > 11$ и $3 > 2$,
 - 3) $15 > 10$ и $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$, 4) $10 < 14$ и $\frac{1}{10} < \frac{1}{7}$,
- 13** Доказать, что если $a > 4$ и $b > 2$, то
- 1) $2ab + 8 > 24$; 2) $5a^2 + b^4 > 96$.
- 1) a 4, b 2, ab , $2ab$, $2ab + 8$
 2) a , b , a^2 , $5a^2$
 b^4 , $5a^2 + b^4$ ◀

Строгие и нестрогие неравенства


5
I

- 1** Заполнить пропуски:

$$\begin{array}{cccc} 1) + \frac{-5 < -1}{4 = 4} & 2) + \frac{-1 > -6}{-5 = -5} & 3) + \frac{-2 > -4}{6 = 6} & 4) + \frac{0 < 12}{-2 = -2} \\ \hline -1 \square 3 & -6 \square -11 & \dots \square \dots & \dots \square \dots \end{array}$$

- 2** Заполнить пропуски:

$$\begin{array}{cccc} 1) \times \frac{1 > -2}{5 = 5} & 2) \times \frac{-5 < 1}{3 = 3} & 3) \times \frac{-7 < -4}{-2 = -2} & 4) \times \frac{2 > -9}{-7 = -7} \\ \hline 5 \square -10 & -15 \square 3 & \dots \square \dots & \dots \square \dots \end{array}$$

- 3** Дописать равенства и неравенства конкретными числами:

$$\begin{array}{ccc} 1) \frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} & 2) \frac{2}{3} > \frac{\square}{\square} > \frac{\square}{\square} & 3) \frac{15}{25} < \frac{\square}{\square} < \frac{\square}{\square} \\ \hline 4) \frac{15}{25} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} & 5) \frac{4}{7} < \frac{\square}{\square} < \frac{6}{7} & 6) \frac{2}{5} < \frac{\square}{\square} < \frac{3}{5} \end{array}$$

(II)

4 С помощью знаков неравенства записать следующие утверждения:

- 1) a — положительное число
- 2) b — отрицательное число
- 3) a^4 — неотрицательное число
- 4) $-a^4$ — неположительное число
- 5) $a^2 + 6$ — положительное число
- 6) $-6 - a^2$ — отрицательное число

5 Найти наибольшее целое число n , удовлетворяющее неравенству:

- 1) $n < 7$; 2) $n \leqslant 7$; 3) $n \leqslant -6$; 4) $n < -6$; 5) $n < \frac{1}{2}$; 6) $n \leqslant -\frac{1}{2}$.

$$n < 21, n = 20; n \leqslant 35, n = 35.$$

► 1) $n < 7, n = \dots$ 2) $n \leqslant 7, n = \dots$

3) $n \leqslant -6, n = \dots$ 4) $n < -6, n = \dots$

5) $n < \frac{1}{2}, n = \dots$ 6) $n \leqslant -\frac{1}{2}, n = \dots$ ◀

6 Найти наименьшее целое число n , удовлетворяющее неравенству:

- 1) $n \geqslant 9$; 2) $n > 9$; 3) $n > -11$; 4) $n \geqslant -11$; 5) $n \geqslant -8\frac{1}{3}$;
- 6) $n > -1\frac{4}{5}$.


$$n > 10, n = 11; n \geqslant 42, n = 42.$$

► 1) $n \geqslant 9, n = \dots$ 2) $n > 9, n = \dots$

3) $n > -11, n = \dots$ 4) $n \geqslant -11, n = \dots$

5) $n \geqslant -8\frac{1}{3}, n = \dots$ 6) $n > -1\frac{4}{5}, n = \dots$ ◀

7 Отметить на числовой оси все целые числа, которые не больше 5 и не меньше -5 .



8 Найти наибольшее целое число x , удовлетворяющее неравенству:

- 1) $\frac{x}{5} < 3$; 2) $\frac{x}{2} \leqslant -5$.

$$\frac{x}{7} \leqslant -3 \mid \cdot 7, x \leqslant -21, x = -21.$$

► 1) $\frac{x}{5} < 3, \dots$ 2) $\frac{x}{2} \leqslant -5, \dots$ ◀

9 Найти наименьшее целое число x , удовлетворяющее неравенству:

1) $\frac{x}{3} \geq -1$; 2) $\frac{x}{9} > 2$.

$\frac{x}{5} \geq -2 \mid \cdot 5, x \geq -10, x = -10.$

1) $\frac{x}{3} \geq -1, \dots$ 2) $\frac{x}{9} > 2, \dots$

10 Записать условие задачи с помощью неравенств.

1) Рост Антона (h см) не превышает роста Коли, равного 165 см, но больше роста Маши, равного 147 см.

147 $\square h \square 165.$

2) Число дней в году (m) не меньше 365 и не больше 366.

$\dots \square m \square \dots$

3) Чайник «Тефаль» (модель 208) вмещает (a л) не больше 1,7 воды.

$\dots \square a \square \dots$

11 Доказать, что если $a + 3b \leq 2a + 7b$, то $a \geq -4b$.

12* Доказать, что $\frac{a^2}{a^4+1} \leq \frac{1}{2}$ при любом a .

III

13 С помощью знаков неравенств записать следующие утверждения:

1) $3a$ — положительное число \dots

2) $\frac{b}{5}$ — отрицательное число \dots

3) $4a^2$ — неотрицательное число \dots

4) $-\frac{b^2}{6}$ — неположительное число \dots

5) $7 + a^4$ — положительное число \dots

6) $-b^4 - 7$ — отрицательное число \dots

14 Найти наибольшее целое число m , удовлетворяющее неравенству:
1) $m < 2,3$; 2) $m \leq 1,6$; 3) $m \leq -15$; 4) $m < -17$.

- 1) $m < 2,3$, $m = \dots$ 2) $m \leq 1,6$, $m = \dots$
3) $m \leq -15$, $m = \dots$ 4) $m < -17$, $m = \dots$ ◀

15 Найти наименьшее целое число m , удовлетворяющее неравенству:
1) $m \geq 5,6$; 2) $m > 7,5$; 3) $m > -17$; 4) $m \geq -15$.

- 1) $m \geq 5,6$, $m = \dots$ 2) $m > 7,5$, $m = \dots$
3) $m > -17$, $m = \dots$ 4) $m \geq -15$, $m = \dots$ ◀

Неравенства с одним неизвестным

6

(I)

1 Верно ли неравенство («да» или «нет»)?

$$(-5) \cdot (-6) > 0 \quad \text{Да}$$

- 1) $-7 \cdot 3 < 0 \dots$; 2) $\frac{14}{-2} > 0 \dots$;
3) $\frac{-6}{-18} < 0 \dots$; 4) $10 \cdot 1,2 - 15 < 0 \dots$;
5) $1,5 \cdot 2 - 2,7 > 0 \dots$; 6) $\frac{2}{3} \cdot 12 - 7 > 0 \dots$.

2 Записать в виде неравенства следующие утверждения:

- 1) сумма чисел 3 и x меньше 1 \dots
2) разность чисел x и 8 больше 19 \dots
3) произведение чисел 10 и x не больше 15 \dots
4) частное чисел x и 3 не меньше 6 \dots
5) утроенная сумма чисел x и 7 не больше -15 \dots
6) полусумма чисел 2 и x не меньше их разности \dots

3 Найти значения x , при которых верно неравенство:

- 1) $5x < 0$ при $x \dots$ 2) $-4x > 0$ при $x \dots$
3) $\frac{1}{2}x^2 + 1 > 0$ при \dots 4) $(x+3)^2 > 0$ при \dots

II

4 Построить график функции и с его помощью заполнить пропуски:

1) $y = 2x + 2$,



$$y(-2) = \dots$$

если $y = 0$, то $x = \dots$

2) $y = -x + 3$,

$$y(2) = \dots$$

если $y = -4$, то $x = \dots$



5 Из чисел 7; 5; 2; 1,5; 0; -2 выписать те, которые являются решениями неравенства:

1) $2x - 3 \geq 1$, \dots 2) $4 - x < 3$, \dots

3) $4(x - 1) < -2$, \dots 4) $2(1 - x) \geq -1$, \dots

6 Решить неравенство:

1) $-5x < 0$, \dots 2) $4x > 0$, \dots

3) $\frac{1}{-2}x^2 - 1 < 0$, \dots 4) $(x - 3)^2 < 0$, \dots



7 Доказать, что при любом значении x справедливо неравенство:

1) $4x(x - 1) + (5x - 1)(x + 1) > -16$;

2) $(x - 4)(x + 4) - 2x^2 < 1$.



- 8** Построен график функции (см. рис.). С помощью графика заполнить пропуски.



1) Значения функции положительны при x

Значения функции отрицательны при x

Значение функции равно 0 при x

Значения функции больше 2 при x

Значения функции меньше 2 при x

2) При $x > 2$ значения функции

При $x < 2$ значения функции

При $x = 2$ значения функции

При $x > -1$ значения функции 3.

При $x < -1$ значения функции 3.

III

- 9** Из чисел $3; 0; \frac{1}{3}; -1; 1$ выписать те, которые являются решениями неравенства:

1) $3x - 2 < 0$,

3) $x + 1 \geqslant 4$,

2) $1 - 6x > 0$,

4) $-x \leqslant -2$,

- 10** Решить неравенство:

1) $15x < 0$,

3) $\frac{x}{7} > 0$,

2) $-8x > 0$,

4) $\frac{x}{11} < 0$,

Решение неравенств

7

I

- 1 Умножить обе части исходного неравенства на число m и результат записать в таблицу:

Исходное неравенство	$m = 2$	$m = -1$	$m = -2$	$m = 4$	$m > 5$	$m < -5$
$3 > \frac{1}{2}$		$-3 < -\frac{1}{2}$				
$4 > -1$		$-4 < 1$				

- 2 Разделить обе части исходного неравенства на число k и результат записать в таблицу:

Исходное неравенство	$k = 4$	$k = 9$	$k = -\frac{1}{3}$	$k = -\frac{1}{8}$
$24 > -48$	$6 > -12$			
$-5 < -1$	$-\frac{5}{4} < -\frac{1}{4}$			

- 3 Упростить выражение:

1) $3(4 - 2x) + 7(1 - x) = \dots$

2) $8(x - 2) - 4(1 - 2x) = \dots$

II

- 4 Решить неравенство устно и записать ответ:

1) $x + 3 < 2;$

2) $x - 2 > -3;$

Ответ.

Ответ.

3) $-2x < 6;$

4) $-3x > -18.$

Ответ.

Ответ.

5 Решить неравенство и изобразить множество его решений на числовой оси:

1) $3x + 7 < 13;$

2) $6x - 5 > 13;$

3) $2 - 3x < 14;$

4) $11 - 4x > 19.$

6 Решить неравенство:

1) $6(x - 5) > 2(x - 3);$

2) $7(y + 1) < 9(y - 3);$

3) $\frac{x-3}{4} < 3;$

4) $\frac{2x-3}{2} \geq \frac{2-x}{3}.$

7 Найти те значения аргумента x , при которых значения функции $y = -3x + 12$:

1) больше 0,

2) меньше 0,

3) больше -3 ,

4) не больше 6,

(III)

8 Решить неравенство:

1) $2x + 20 > 0;$

2) $1 - 2x \leq 3.$

Ответ.

Ответ.

9 Найти наибольшее целое число, являющееся решением неравенства:

1) $5 - 6x > 2(4 - x);$

2) $6(1 - x) > x - 1.$

Ответ.

Ответ.

- 10** Найти наименьшее целое число, являющееся решением неравенства:

1) $3,2x - 2 > 2x + 0,4;$

2) $5,5 + 4x > 1 + x.$

Ответ.

Ответ.

- 11** Решить неравенство и изобразить множество его решений на числовой оси:

1) $\frac{x-6}{3} < -1;$

2) $\frac{x-1}{5} - \frac{x-2}{3} \geqslant \frac{2}{15}.$

**Системы неравенств с одним неизвестным.
Числовые промежутки**

**8****I**

- 1** Поставить в клетке знак $>$ или $<$ так, чтобы получилось верное неравенство:

1) $-2 \cdot 3 \square 1 \cdot (-3);$

2) $0 \cdot (-4) \square 5 \cdot (-4);$

3) $\frac{1}{2} \cdot (-10) \square \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-10);$

4) $\left(-\frac{1}{5}\right) \cdot 15 \square \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 18.$

2 Решить неравенство и изобразить множество его решений на числовой оси:

1) $9x > 27;$

2) $7x < 21;$

3) $5x \leq -40;$

4) $6x \geq -36;$

5) $-4x \leq -9;$

6) $-8x \geq -3.$

3 Из чисел, записанных во второй строке, выбрать те, которые являются решениями данного неравенства, и подчеркнуть их:

1) $4x < 3x + 4;$

2) $2(x + 4) < -16;$

10; -2; 0; 4; 1; 5;

4; -4; -12; -14; 0; -9.

(II)

4 Из чисел, записанных рядом с системой неравенств, выбрать нужные и заполнить таблицу:

1) $\begin{cases} x+2 < 5, \\ 2-x \leq 3; \end{cases}$

2) $\begin{cases} 3x-2 \leq 4, \\ x-3 > -2; \end{cases}$

3) $\begin{cases} 4x-5 \geq -1, \\ x+6 > 2; \end{cases}$

4) $\begin{cases} x-7 < -2, \\ 2x+1 < 10. \end{cases}$

Система	1	2	3	4
Данные числа	-2; -1; 0; 2	-3; 2; 1; 4	-3; 0; 1; 3	-4; 0; -1; 2
Решения 1-го неравенства	-2; -1; 0; 2			
Решения 2-го неравенства	-1; 0; 2			
Решения системы	-1; 0; 2			

5 Найти все целые числа, являющиеся решениями системы неравенств:

1) $\begin{cases} x > -2, \\ x < 8; \end{cases}$

2) $\begin{cases} x \leq 4, \\ x \geq -4; \end{cases}$

Ответ.

Ответ.

3) $\begin{cases} x > -7, \\ x \leq 0; \end{cases}$

Ответ.

4) $\begin{cases} x < 3,7, \\ x \geq -2,5. \end{cases}$

Ответ.

6

Изобразить на числовой оси множество чисел x , удовлетворяющих двойному неравенству:

1) $-7 < x < -3;$



2) $0 \leq x \leq 3,5;$



3) $-2 \frac{1}{2} \leq x < 1,5;$



4) $-4 \frac{1}{2} < x \leq -0,5;$



7

Изобразить на числовой оси числовые промежутки:

1) $(-2; 3);$



2) $[4; 9];$



3) $[-10; -5];$



4) $(0; 4 \frac{1}{2}].$



8

Множество чисел, изображенных на числовой оси, записать в виде двойного неравенства и числового промежутка:



$0 < x \leq 6, (0; 6].$



1) $\dots, \dots,$



2) $\dots, \dots,$



3) $\dots, \dots,$



4) $\dots, \dots,$

9

Установить, является ли число x_0 решением системы неравенств («да» или «нет»):

1) $\begin{cases} 2x + 1 > 1, \\ x - 3 < 0, \\ 2 - x > 1; \end{cases} \quad x_0 = 1$

Ответ.

2) $\begin{cases} 5 - x < 4, \\ 4x - 7 > 1, \\ 3x + 6 > 0. \end{cases} \quad x_0 = 3$

Ответ.

- 10*** На одной координатной плоскости изображены графики линейных функций $y = \frac{3}{2}x - 3$ и $y = \frac{1}{2}x + 1$. Заполнить пропуски в предложениях.

1) Значения обеих функций положительны при


2) Значения обеих функций отрицательны при

3) Значения функции

$$y = \frac{1}{2}x + 1$$

не меньше 0 и не больше 3 при

4) Если $-2 < x < 2$, то значения функции $y = \frac{3}{2}x - 3$



(положительны, отрицательны).

5) Если $-2 < x < 2$, то значения функции $y = \frac{1}{2}x + 1$

6) Если $x > 4$, то значения функции $y = \frac{3}{2}x - 3$

соответствующих значений функции $y = \frac{1}{2}x + 1$

7) Значения функции $y = \frac{1}{2}x + 1$ больше соответствующих значений функции $y = \frac{3}{2}x - 3$ при


- 11*** Одна сторона треугольника равна 2,4 дм, а другая 5,2 дм. Какой может быть длина третьей стороны, если она выражается целым числом дециметров?

$$a < b + c$$

$$b < a + c, \quad b - c < a$$

$$c < a + b$$

$$b - c < a < b + c$$



Пусть длина третьей стороны треугольника x дм, тогда по свойству сторон треугольника имеем:

$$\dots < x < \dots ; \quad \dots < x < \dots$$

Ответ.

(III)

12

Из чисел, записанных справа от системы, выбрать нужные и заполнить пропуски:

$$1) \begin{cases} 6 - x < 10, \\ 2x + 7 \geqslant 1; \end{cases} \quad 0; -5; -3,5; -3 \quad 2) \begin{cases} 8 - 2x > 1, \\ 3x + 2 \geqslant -1. \end{cases} \quad 4; -1; 1,5; 0$$

Решения 1-го неравенства:

Решения 1-го неравенства:

Решения 2-го неравенства:




Решения 2-го неравенства:

Решения системы:

Решения системы:

13

Заполнить таблицу:

Двойное неравенство	Числовой промежуток	Изображение на числовой оси
$-9 < x < 0$	$(-9; 0)$	
$-3 \leqslant x < 7$		
$-0,5 < x \leqslant 6$		
$-11 \leqslant x \leqslant 11$		
	$(-5; 5]$	
	$(1,2; 3,5)$	
	$\left[-4\frac{3}{5}; -1\frac{1}{5} \right]$	
	$[0,6; 9]$	
		
		
		
		

Решение систем неравенств

9

I

1 Решить неравенство:


- 1) $-9x \leqslant 81$; 2) $-15x \geqslant -30$;
3) $14 > 7x$; 4) $64 < -8x$;
5) $2x - 3 > 7x - 5$; 6) $3x + 4 < 5x + 3$.

2 Изобразить на числовой оси множество чисел x , удовлетворяющих данному неравенству или системе неравенств:

1) $x < 8,5$; 2) $x > -7\frac{1}{2}$; 3) $x \geqslant -2,7$; 4) $x \leqslant 6$;



5) $\begin{cases} x \geqslant 1, \\ x \leqslant 5; \end{cases}$ 6) $\begin{cases} x > 3, \\ x \leqslant 7; \end{cases}$ 7) $\begin{cases} x < -2, \\ x \geqslant -6; \end{cases}$ 8) $\begin{cases} x < 0, \\ x > -4. \end{cases}$



3 Раскрыть скобки и привести подобные члены:

- 1) $(2x + 10) - (3x - 12) =$
2) $(3x - 7) + (1 - x) =$
3) $2(4x + 1) - 3(2 + x) =$
4) $7(x - 2) + 2(-5 - 6x) =$

II

4 Изобразить решения данной системы неравенств на числовой оси и записать ответ.



Ответ. $x < -4$.

1) $\begin{cases} x > 3; \\ x > 1; \end{cases}$

2) $\begin{cases} x \geq -5; \\ x \geq -1; \end{cases}$

3) $\begin{cases} x \leq -5; \\ x \leq -1; \end{cases}$



Ответ.

Ответ.

Ответ.

4) $\begin{cases} x > 2; \\ x < 9; \end{cases}$

5) $\begin{cases} x < -4; \\ x \geq -8. \end{cases}$

Ответ.


Ответ.

5 Решить систему неравенств:

$\begin{cases} 6x > 12, \\ 2x > -4; \end{cases}$

$\begin{cases} x > 2, \\ x > -2. \end{cases}$

Ответ. $x > 2.$



1) $\begin{cases} 3x + 9 \leq 0, \\ 4x - 8 < 0; \end{cases}$

2) $\begin{cases} 5x + 10 > 0, \\ 2x - 3 < 0; \end{cases}$

3) $\begin{cases} 15 - 3x > 0, \\ 1 - x < -3. \end{cases}$

Ответ.

Ответ.

Ответ.

6 Решить систему неравенств:

1) $\begin{cases} 5x - 12 > x, \\ x - 15 > 3x + 1; \end{cases}$

2) $\begin{cases} 5(x + 1) \leq 2(2x + 1), \\ 3x + 2 \leq -1. \end{cases}$

$\begin{cases} 2x - 3 > x - 5, \\ 3x - 2 > 4x - 3; \end{cases}$



(1) $2x - 3 > x - 5,$
(2) $3x - 2 > 4x - 3,$

$2x - x > 3 - 5, x > -2.$
 $3x - 4x > 2 - 3, x < 1.$

Ответ. $-2 < x < 1.$

7 Длина основания равнобедренного треугольника равна 16 см. Каким числом может быть выражена длина боковой стороны, если известно, что периметр треугольника меньше 90 см?

Пусть x см — длина боковой стороны треугольника, тогда его периметр равен По условию < 90 , по свойству сторон треугольника + > 16 .

Получаем систему неравенств: $\left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \dots \end{array} \right.$

Решаем систему неравенств:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \dots \end{array} \right.$$

Ответ. Длина боковой стороны может быть любым числом из интервала

8 Если бы велосипедист проезжал в день на 10 км больше, чем на самом деле, то за 6 дней он проехал бы меньше 420 км. Если бы он проезжал в день на 5 км меньше, чем на самом деле, то за 12 дней он проехал бы больше 420 км. Сколько километров мог проезжать за один день этот велосипедист?

Пусть за один день велосипедист проезжал x км. Если бы он проезжал в день на 10 км больше, т. е. км, то за 6 дней он проехал бы км. По условию < 420 . Если бы велосипедист проезжал в день на 5 км меньше, т. е. км, то за 12 дней он проехал бы км. По условию > 420 .

Получаем систему: $\left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \dots \end{array} \right.$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \dots \end{array} \right.$$

Ответ. Велосипедист мог проезжать за день больше км, но меньше км.

9* Решить систему неравенств:

$$1) \begin{cases} x+3 < 0, \\ 5-x > 0, \\ 6x+12 \leqslant 0; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 4x-8 > 0, \\ x-4 > 0, \\ x+1 < 0. \end{cases}$$

Ответ.

Ответ.

(III)

10 Изобразить решение данной системы неравенств на числовой оси и записать ответ:

$$1) \begin{cases} x > 0, \\ x > 6; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x < 0, \\ x \leq -7; \end{cases} \quad 3) \begin{cases} x \leq 1, \\ x > -2; \end{cases} \quad 4) \begin{cases} x \geq -2, \\ x \leq 1,5. \end{cases}$$



Ответ. Ответ. Ответ. Ответ.

11. Решить систему неравенств:

$$\begin{array}{ll} 1) \begin{cases} 15x - 30 > 0, \\ 2x + 7 \geq 0; \end{cases} & 2) \begin{cases} 2 - 3x < 0, \\ 6x + 1 < 0; \end{cases} \\ 3) \begin{cases} x - 3 < 0, \\ 4x + 9 > 0; \end{cases} & 4) \begin{cases} \frac{x}{4} + 3 < 6 - \frac{x}{8}, \\ 7(2x - 5) < 5(x - 7). \end{cases} \end{array}$$

► 1)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Данное число	4	-4	0	3	-8,7	a^2
Модуль данного числа		4				

2 Изобразить на числовой оси множество чисел:

1) $0 < x < 5$;

2) $-5 < x < 0$;

3) $1,5 < x \leq 4,5$;

4) $-2,5 \leq x < -0,5$.

3 Решить систему неравенств:

1) $\begin{cases} x > 11, \\ x > 17; \end{cases}$

2) $\begin{cases} x < 11, \\ x < 17; \end{cases}$

3) $\begin{cases} x \leq -3, \\ x \geq -5; \end{cases}$

4) $\begin{cases} x > 5, \\ x < 3. \end{cases}$

4 Решить уравнение:

1) $-x = 5$;

2) $-x = -3,2$;

3) $-3x = 63$;

4) $-\frac{1}{4}x = -1$

II

5 Заполнить пропуски:

1) $|a| = \begin{cases} a, \text{ если } \dots, \\ -a, \text{ если } \dots; \end{cases}$ 2) $|m| = \begin{cases} \dots, \text{ если } m \geq 0, \\ \dots, \text{ если } m < 0. \end{cases}$

6 Вычислить устно и записать ответ:

1) $|5| + |-5| = \dots$

2) $|-6| - |6| = \dots$

3) $9 \cdot |5 - 7| = \dots$

4) $|10 - 10| \cdot 7 = \dots$

5) $-3 \cdot |-4| = \dots$

6) $|-18| : |-3| = \dots$

7 Дописать утверждения.

1) Если $a > 0$, то $a + |a| = \dots$

2) Если $a < 0$, то $a + |a| = \dots$

3) Если $a < 0$, то $a - |a| = \dots$

4) Если $a > 0$, то $a - |a| = \dots$

5) Если $a > 0$, то $\frac{|a|}{a} = \dots$

6) Если $a < 0$, то $\frac{a}{|a|} = \dots = \dots$

8 Решить уравнение:

1) $|7 - 14x| = 0;$

Ответ.

3) $|x| = 1;$

2) $8|x| + |-5| = 5;$

Ответ.

4) $|5x| = 15;$

Ответ.

5) $3|2 - 3x| = -15;$

Ответ.

6)* $5|6 - x| = 6 - x.$

Ответ.

Ответ.

9 Решить уравнение:

|7 - 6x| = 1

1) $7 - 6x = 1,$
 $-6x = -6,$
 $x = 1.$

2) $7 - 6x = -1,$
 $-6x = -8,$
 $x = \frac{4}{3}.$

Ответ. $x_1 = 1, x_2 = \frac{4}{3}.$

1) $|7 + 4x| = 5;$

2) $|9 - 2x| = 3;$

Ответ.

Ответ.

3)* $|3x - 6| = x;$

4)* $|x - 1| + x = -3.$




Ответ.

Ответ.

10* Дописать утверждение.Если $1 < x < 2$, то $x + |1 - x| + 2|x - 2| =$

11

Заполнить таблицу:

Неравенство с модулем	Запись неравенства с модулем в виде двойного неравенства или системы неравенств	Изображение множества решений неравенства на числовой оси
$ x < 7$	$-7 < x < 7$	
$ x \leq 15$		
	$-3,4 \leq x \leq 3,4$	
	$-7\frac{1}{2} < x < 7\frac{1}{2}$	
		
		
$ x \geq 5$		

12

Решить неравенство:

- 1) $|x+1| < 1$; 2) $|3-x| \leq 2$; 3) $|1+2x| > 1$;
 4) $|3-4x| \geq 9$; 5) $|5-2x| > -4$; 6) $|6-x| \leq 0$.

13* Найти такие значения a и b , чтобы решениями неравенства $|x-a| \leq b$ был отрезок $-5 \leq x \leq 9$.

Запишем неравенство $|x-a| \leq b$ в виде Это двойное неравенство означает то же самое, что и система неравенств

$$\begin{cases} x-a \geq -b \\ x-a \leq b \end{cases}, \text{ откуда } \begin{cases} x \geq a-b \\ x \leq a+b \end{cases}$$

По условию $= -5$ и $= 9$.

Решаем систему уравнений:

$$\begin{cases} a-b = -5 \\ a+b = 9 \end{cases}$$

Ответ. $a = \dots$, $b = \dots$. ◀

(III)

14 Решить уравнение:

1) $72 + 9|x| = 0$;

2) $|8x - 1| = 9$.

.....
.....

Ответ.

.....
.....

Ответ. ◀

15 Решить неравенство:

1) $|5x - 7| < 3$;

2) $|6x + 1| \geq 11$.

.....
.....

Ответ.

.....
.....

Ответ. ◀

II глава Приближенные вычисления

Приближенные значения величин. Погрешность приближения

§

11

I

1 Вычислить устно и записать ответ:

$$\begin{array}{ll} 1) \left| -\frac{3}{7} \right| + \left| \frac{4}{7} \right| = \dots & 2) \left| -\frac{5}{8} \right| - \left| -\frac{3}{8} \right| = \dots \\ 3) |-0,73| - |-0,23| = \dots & 4) |-1,27| - |2,47| = \dots \\ 5) \left| -\frac{2}{3} \right| \cdot \left| \frac{6}{5} \right| = \dots & 6) \left| -\frac{3}{7} \right| : \left| -\frac{9}{14} \right| = \dots \end{array}$$

2 Вычислить:

$$\begin{array}{ll} 1) |3,5 - 3,683| = \dots & 2) |-7,6 + 7,38| = \dots \\ 3) \left| \frac{3}{8} - 0,37 \right| = \dots & 4) \left| -7 \frac{7}{8} - (-7,8) \right| = \dots \\ 3 \quad \left| \begin{array}{r} 8 \\ \hline \dots \end{array} \right. & 7 \quad \left| \begin{array}{r} 8 \\ \hline \dots \end{array} \right. \end{array}$$

3 Решить уравнение:

$$\begin{array}{ll} 1) |x - 3| = 7; & 2) |4 - x| = 9; \\ \text{→ (1)} \dots & \text{→ (1)} \dots \\ \text{(2)} \dots & \text{(2)} \dots \\ \text{Ответ.} \dots & \text{Ответ.} \dots \\ 3) |2x - 3| = 3; & 4) |7 - 2x| = 9. \\ \text{→ (1)} \dots & \text{→ (1)} \dots \\ \text{(2)} \dots & \text{(2)} \dots \\ \text{Ответ.} \dots & \text{Ответ.} \dots \end{array}$$

II

4 Погрешность приближения:

- 1) числа 23 числом 17 равна
- 2) числа — 16 числом — 14 равна

5 Погрешность приближения числа x числом a равна b . Найти:
1) x , если $a=3,27$, $b=0,03$; 2) a , если $x=-5,47$, $b=0,007$.

► 1) Решим уравнение 2) Решим уравнение
 $|x-3,27|=0,03$. $|-5,47-a|=0,007$.

$$(1) \dots \quad (1) \dots$$

$$(2) \dots \quad (2) \dots$$

Ответ. $x_1= \dots$ $x_2= \dots$ Ответ. $a_1= \dots$ $a_2= \dots$ ◀

6 С помощью графиков получили, что прямые $y=7x-6$ и $y=2$ пересекаются в точке с абсциссой $x=1$. Найти погрешность этого приближения.

► ◀
 Ответ. ◀

7* Найти число x , если погрешность его приближения числом 4 в 10 раз меньше числа x .

► Решим уравнение $|x-4|=\frac{x}{10}$.

$$(1) \dots$$

$$(2) \dots$$

Ответ. $x_1=4\frac{4}{9}$, $x_2=3\frac{7}{11}$. ◀

8* Пусть y — погрешность приближения числа $\frac{5}{6}$ числом 0,83. Найти погрешность приближения числа y числом 0,1.

►
 Ответ. $\frac{1}{300}$. ◀

III

9 Погрешность приближения:

1) числа $\frac{6}{11}$ числом 0,5 равна

2) числа — 17,89 числом — 17,9 равна

- 10 Что больше: погрешность приближения числа $\frac{1}{7}$ числом $\frac{1}{6}$ или числа $\frac{1}{5}$ числом $\frac{1}{6}$?

Ответ.

- 11 Верно ли, что погрешность приближения числа $\frac{3}{11}$ числом 0,3 меньше $\frac{3}{111}$?

Ответ.

- 12 С помощью графиков получили, что прямые $y = 8x + 10$ и $y = 1$ пересекаются в точке с абсциссой $x = -1$. Найти погрешность этого приближения.

Оценка погрешности



12

I

- 1 Записать утверждения в виде неравенства.

1) Погрешность приближения числа $\frac{1}{3}$ числом 0,4 меньше 0,1:

2) Погрешность приближения числа $-\frac{5}{8}$ числом $-0,6$ не больше 0,025:

- 2 Записать неравенство в виде двойного неравенства и системы двух неравенств:

1) $|x - 3| \leqslant 8;$

2) $|4 - 7x| \leqslant 2.$

3 Записать двойное неравенство в виде неравенства, содержащего знак модуля:

1) $-3 \leq x + 7 \leq 3$;

2) $-2 \leq 3 - 5x \leq 2$.

4 Решить неравенство:

1) $|x - 2,7| \leq 0,7$;

2) $|x + 3,4| \leq 0,4$.

(II)

5 Найти устно наибольшее и наименьшее значения x и заполнить таблицу:

x	Наибольшее значение	Наименьшее значение
$x = 193 \pm 3$		
$x = 7 \frac{1}{2} \pm \frac{1}{3}$	$7 \frac{5}{6}$	$7 \frac{1}{6}$
$x = -231 \pm 2$		
$x = -0,322 \pm 0,02$		

6 Пусть $x = -6,3 \pm 0,7$. Выяснить, может ли точное значение x быть равным («да» или «нет») числу:

1) $5,9$

2) $-7,1$

3) $-5,5$

4) $-6,9$

7 Доказать утверждения.

Число $-13,4$ является приближенным значением числа $-13,423$ с точностью до $0,1$.

► $|-13,423 - (-13,4)| = 0,023 \leq 0,1$. ◁

1) Число $-8,5$ является приближенным значением числа $-8,367$ с точностью до $0,3$.

2) Число $-0,27$ является приближенным значением числа $-\frac{11}{40}$ с точностью до $0,01$.

▶ 1)
.....
.....

- 8* Найти такие значения a и h , чтобы запись $x = a \pm h$ означала, что $9,01 \leq x \leq 9,05$.

▶ $\begin{cases} a - h = \dots, \\ a + h = \dots, \end{cases}$

Ответ. $a = 9,03$, $h = 0,02$. ◀

- 9 Диаметр планеты Марс равен (6776 ± 5) км, а диаметр Юпитера равен $(141\,700 \pm 100)$ км. Какими могут быть точные значения этих диаметров?

Ответ. Диаметр Марса: $\dots \leq x \leq \dots$,

Юпитера: $\dots \leq x \leq \dots$.

III

- 10 Записать в виде двойного неравенства:

1) $x = 6,23 \pm 0,17$

2) $x = 7 \frac{2}{3} \pm \frac{1}{6}$

3) $x = -17,27 \pm 0,13$

4) $x = -13 \frac{5}{12} \pm \frac{7}{12}$

- 11 Выполнив вычисления устно, записать в верхней клетке наименьшее, а в нижней — наибольшее значение x :

1) $x = 217 \pm 5$

.....
.....
.....

2) $x = 12 \frac{1}{3} \pm \frac{1}{6}$

.....
.....
.....

3) $x = -187 \pm 4$

.....
.....
.....

4) $x = -3,23 \pm 0,03$

.....
.....
.....

- 12 Пусть $x = -3,7 \pm 0,3$. Выяснить, может ли число x быть равным («да» или «нет») числу:

1) $-3,95$

2) $-4,1$

3) $-3,3$

4) $-3,4$

Округление чисел

**13****I**

1 Округлить число 7,473:

1) до единиц ; 2) до десятых ; 3) до сотых

2 Выяснить, какое приближение числа 5,384 точнее (погрешность приближения меньше):

1) числом 5 или числом 6: $|5,384 - 5| = \dots = |5,384 - 6| = \dots$ Ответ. Первое;

2) числом 5,3 или числом 5,4
Ответ.

3) числом 5,38 или числом 5,39
Ответ.

4) числом 5,383 или числом 5,385
Ответ.

II

3 При округлении числа $x = 2,73\dots$ до сотых получили $x \approx 2,74$. Какая цифра в записи числа x может стоять на четвертом месте?

Ответ.

4 При округлении числа $x = 4,76$ до сотых получили $x \approx 4,76$. Какая цифра в записи числа x может стоять на четвертом месте?

Ответ.

5 Округлить число до единиц, десятых и сотых долей:

1) 53,725

2) 68,453

6 Округлить данное число до десятых и до сотых, найти погрешности приближений:

1) 17,836

2) 23,584

7 Найти приближение смешанного числа: 1) $2\frac{7}{9}$; 2) $4\frac{8}{15}$ — десятичной дробью с одним и с двумя знаками после запятой так, чтобы погрешности приближений были наименьшими.

$3\frac{5}{6} = 3,833\dots$. По правилу округления чисел

$3\frac{5}{6} \approx 3,8$, $3\frac{5}{6} \approx 3,83$.

1) $2\frac{7}{9}$

2) $4\frac{8}{15}$

- 8 Найти приближение обыкновенной дроби десятичной дробью с одним и с двумя знаками после запятой так, чтобы погрешности приближений были наименьшими; записать результат в виде обыкновенной дроби:

1) $\frac{4}{7}$

2) $\frac{5}{11}$

- 9* Автомобиль движется со скоростью 63 км/ч. Выразить эту скорость в метрах в секунду и округлить результат до 1 м/с.

Ответ. 18 м/с.

(III)

- 10 Округлить до единиц, десятых и сотых долей число 23,347.

- 11 Округлить число до сотых долей и найти погрешность приближения:

1) 7,453

2) 8,587

Относительная
погрешность



14

I

- 1 Найти:

1) 20% от числа 235

2) 15% от числа 150

- 2 Выяснить, сколько процентов составляет:

1) число 17 от числа 272

2) число 78 от числа 65

3 Найти с точностью до 0,1%, сколько процентов составляет:

1) число 3 от числа 78

2) число 0,2 от числа 17

4 Найти абсолютную погрешность приближения, если:

1) длина стола равна 1,4 м, а при измерении получено 1,6 м;

2) расстояние между пунктами A и B равно 6,8 км, а при измерении получено 6,6 км.

Ответ. 1) 2)

5 Число $|x - 3,2|$ составляет 2% от числа 3,2. Найти x .

Ответ.

(II)

6 С точностью до 0,1 найти относительную погрешность приближения:

1) числа $\frac{1}{3}$ числом $\frac{2}{7}$

2) числа $\frac{1}{2}$ числом $\frac{2}{9}$

7 Найти в процентах относительную погрешность приближения:

1) числа 0,2 числом $\frac{2}{9}$

2) числа 0,4 числом $\frac{4}{11}$

8 Найти в процентах относительную погрешность измерений, приведенных в задаче 4:

1) ; 2)

9 Число 4,72 является приближенным значением числа x с относительной погрешностью 3%. Найти абсолютную погрешность этого приближения.

10* Найти число x , если его приближенное значение с недостатком равно 5,3 и относительная погрешность этого приближения равна 10%.

Ответ. $x = 5,83$.

11 Диаметр планеты Уран равен $(5,07 \cdot 10^4 \pm 100)$ км. Длина рулона обоев равна $(18 \pm 0,5)$ м. Какое измерение более точное?

III

12 Найти абсолютную и относительную погрешности приближения:

1) числа $0,26$ числом $\frac{1}{4}$

2) числа $\frac{2}{5}$ числом $\frac{1}{3}$

13 С точностью до $0,1\%$ найти относительную погрешность приближения:

1) числа $\frac{3}{7}$ числом $0,4$

2) числа $\frac{7}{11}$ числом $0,6$

14 Какое измерение точнее: $x = (600 \pm 1)$ км или $y = (8 \pm 0,1)$ см?

Стандартный вид числа

§ 16

I

Стандартный вид числа — запись $a \cdot 10^n$, где $1 \leq a < 10$, n — натуральное число.

1 Записать в стандартном виде число:

1) $2370000 =$

2) $456300 =$

2 Округлить число до тысяч и записать результат в стандартном виде:

1) $23756 =$

2) $375521 =$

II

Стандартный вид числа — запись $a \cdot 10^n$, где $1 \leq |a| < 10$, n — целое число; a — мантисса, n — порядок числа.

3 Заполнить таблицу:

Число	342000	-7800000	0,00243	-0,000678
Стандартный вид числа			$2,43 \cdot 10^{-3}$	
Знак числа			+	
Мантисса			2,43	
Знак порядка			-	
Порядок			-3	

4 Округлив мантиссу до сотых, найти погрешность полученного приближения числа:

1) $3,7523 \cdot 10^2$

Ответ. 0,23.

2) $7,8261 \cdot 10^{-3}$

Ответ. $3,9 \cdot 10^{-6}$.

5 Вычислить и результат проверить умножением:

1) $0,6216 : 168 =$

Проверка:

2) $0,6419 : 131 =$

Проверка:

(III)

6 Вычислить на МК:

1) $(4,56 \cdot 10^9) \cdot (3,22 \cdot 10^{-10}) =$

2) $(3,68 \cdot 10^{23}) \cdot (5,75 \cdot 10^{-21}) =$

3) $2431 : (5,72 \cdot 10^7) =$

4) $235 : (1,88 \cdot 10^{14}) =$

III Квадратные корни

Арифметический квадратный корень



20

I

1 Вычислить:

1) $11^2 = \dots$ 2) $(0,1)^2 = \dots$

3) $\left(1\frac{2}{7}\right)^2 = \dots$ 4) $\left(-2\frac{1}{4}\right)^2 = \dots$

2 Из чисел $3; -2; \frac{1}{2}$ выписать те, которые являются корнями уравнения:

1) $3x + 7 = 1 \dots$ 2) $5 - 4x = 3 \dots$

3) $(x - 3)(x + 2) = 0 \dots$ 4) $(2x - 1)(x - 3) = 0 \dots$

5) $x^2 - 1 = 8 \dots$ 6) $x^2 = 8 \dots$

3 Решить уравнение:

1) $(x - 4)(x + 5) = 0;$ 2) $(x + 7)(2x - 3) = 0;$

Ответ. \dots Ответ. \dots

3) $x^2 - 16 = 0;$ 4) $x^2 + 5 = 0.$

Ответ. \dots Ответ. \dots

4 Найти положительные корни уравнения:

1) $(x - 3)(x - 4) = 0 \dots$ 2) $(x + 5)(x - 7) = 0 \dots$

II

5 Найти отрицательные корни уравнения:

1) $x^2 - 36 = 0 \dots$

2) $(4 + x)(4 - x) = 16 \dots$

6 Найти квадратные корни из числа:

1) 169; 2) 144; 3) 0; 4) $-16.$

► 1) Для нахождения квадратных корней из числа 169 нужно решить уравнение $x^2 = 169$, т. е. уравнение, откуда $(x - 13)(x + \dots) = 0$, $x_1 = \dots$, $x_2 = \dots$

2)

3)

4)

7 Найти положительный и отрицательный квадратные корни из числа:

- 1) 64; 2) 0,16; 3) 2,89; 4) -81.

Ответ.

8 Найти арифметический квадратный корень из числа:

- 1) 0,64; 2) 0,16; 3) 196; 4) 625; 5) 256; 6) -0,16.

Ответ.

9 Вычислить:

1) $3^3 + 5 \cdot \sqrt{81} = \dots$

2) $4 \cdot \sqrt{225} - 3 \cdot \sqrt{169} = \dots$

3) $\sqrt{8^2 + 15^2} = \dots$

4) $\sqrt{12^2 - 5 \cdot 4^2} = \dots$

10 Найти значение выражения:

1) $4 \sqrt{14 + 2a}$ при $a = 65$

2) $3 \sqrt{3a - 50}$ при $a = 38$

11* Выяснить, при каких значениях x имеет смысл выражение:

1) $\sqrt{x-3} + \sqrt{2x-3}$; 2) $\sqrt{x+3} - \sqrt{3-2x}$;

$$\begin{cases} x-3 \geqslant 0, \\ 2x-3 \geqslant 0; \end{cases} \dots$$

Ответ.

Ответ.

III

12 Выяснить, верно ли равенство («да» или «нет»):

1) $\sqrt{81} = 9$; 2) $\sqrt{121} = 11$;

3) $\sqrt{36} = -6$; 4) $\sqrt{-25} = 5$

13 Найти арифметический квадратный корень из числа:

- 1) 324; 2) 361; 3) 144; 4) -0,09.

Ответ.

14

Вычислить:

- 1) $(\sqrt{225})^2 = \dots$ 2) $(\sqrt{1,69})^2 = \dots$
 3) $5 - \sqrt{36} = \dots$ 4) $4 + 2\sqrt{49} = \dots$
 5) $3 \cdot \sqrt{0,64} = \dots$ 6) $6 : \sqrt{2,25} = \dots$

Действительные числа

**21****1**1 Из чисел $3; 8; 15; 0; -7; -13; \frac{3}{8}; \frac{5}{7}; 2\frac{1}{3}; 3\frac{2}{5}$ выписать:

- 1) натуральные
 2) целые
 3) дробные (нечелые)
 4) рациональные

2 Заменив десятичные дроби обыкновенными, вычислить:

1) $(0,7 \cdot \frac{5}{14} + 1,6 \cdot \frac{3}{4}) : 2,9 = \dots$

2) $(2,6 : \frac{13}{15} + 3,6 \cdot \frac{5}{6}) \cdot 2,7 \cdot \frac{2}{9} = \dots$

3

Результат деления записать с точностью до 0,1:

1) $763 : 24 \approx \dots$ 2) $883 : 37 \approx \dots$

763	24
-------	------

883	37
-------	------

4Дано: $100x = 2$. Найти:

- 1) $10x = \dots$ 2) $x = \dots$
 3) $0,1x = \dots$ 4) $9x = \dots$

5 Дано: $x = 0,3$. Найти:

1) $10x = \dots$ 2) $100x = \dots$

3) $0,1x = \dots$ 4) $90x = \dots$

(II)

6 Записать в виде конечной или бесконечной периодической дроби рациональное число:

1) $\frac{3}{8}$; 2) $-5\frac{7}{16}$; 3) $\frac{1}{45}$; 4) $-6\frac{7}{18}$.

1) $\frac{3}{8} = \dots$ 2) $-5\frac{7}{16} = \dots$

$$3 \left| \begin{array}{c} 8 \\ \hline \end{array} \right.$$

$$7 \left| \begin{array}{c} 16 \\ \hline \end{array} \right.$$

3) $\frac{1}{45} = \dots$ 4) $-6\frac{7}{18} = \dots$

$$1 \left| \begin{array}{c} 45 \\ \hline \end{array} \right.$$

$$7 \left| \begin{array}{c} 18 \\ \hline \end{array} \right.$$

7 Записать в виде обыкновенной дроби бесконечную периодическую десятичную дробь:

1) $3,(8)$; 2) $1,(81)$; 3) $0,1(6)$; 4) $0,2(15)$.

1) $x = 3,888\dots$ 2) $x = \dots$

$10x = \dots$ $100x = \dots$

$9x = \dots$ $99x = \dots$

$x = \dots$ $x = \dots$

3) $x = \dots$ 4) $x = \dots$

$10x = \dots$ $10x = \dots$

$100x = \dots$ $1000x = \dots$

$90x = \dots$ $990x = \dots$

$x = \dots$ $x = \dots$

8 Из чисел $3,7$; $-2,9$; $\sqrt{13}$; $\frac{2}{3}\sqrt{81}$; $0,(16)$; $\sqrt{17}$; $-\sqrt{18}$; $0,515115111\dots$ (число единиц после очередной цифры 5 возрастает) выписать:

1) рациональные

2) иррациональные

3) действительные

9 С точностью до 0,1 вычислить на МК:

1) $\sqrt{15} + \sqrt{17} \approx \dots$ 2) $\sqrt{33} - \sqrt{21} \approx \dots$

3) $5,1\sqrt{19} + \sqrt{27} \approx \dots$ 4) $\sqrt{77} - 3,4\sqrt{3,1} \approx \dots$

III

10 Из чисел $6; 29; -7; \frac{9}{16}; -4\frac{5}{13}; 3,21; -4,2(2); \sqrt{17}; \frac{2}{3}\sqrt{36}; \sqrt{21}$ выписать:

1) натуральные

2) целые

3) рациональные

4) иррациональные

5) действительные

11 Представить в виде десятичной дроби число:

1) $4\frac{17}{50} = 4\frac{34}{100} = \dots$ 2) $3\frac{7}{25} = \dots$

3) $-\frac{5}{8} = \dots$ 4) $4\frac{9}{16} = \dots$

$$5 \left| \begin{array}{r} 8 \\ \hline \end{array} \right.$$

$$9 \left| \begin{array}{r} 16 \\ \hline \end{array} \right.$$

12 Представить в виде обыкновенной дроби число:

1) $9,(27)$; 2) $0,3(63)$.

1) $x = \dots$ 2) $x = \dots$

$100x = \dots$ $10x = \dots$

$99x = \dots$ $1000x = \dots$

$x = \dots$ $990x = \dots$

$x = \dots$ □

13 С точностью до 0,01 вычислить на МК:

1) $\sqrt{17} \approx \dots$ 2) $\sqrt{45} \approx \dots$

3) $\sqrt{12,6} \approx \dots$ 4) $\sqrt{62,7} \approx \dots$

Квадратный корень из степени

**22****I**

1 Вычислить устно и записать ответ:

1) $\sqrt{7^2 + 2 \cdot 4^2} = \dots$ 2) $\sqrt{8^2 - 3 \cdot 4^2} = \dots$
3) $\sqrt{4^2} - \sqrt{7^2} = \dots$ 4) $\sqrt{(-5)^2} + \sqrt{(-4)^2} = \dots$

2 Найти значение выражения $\sqrt{a^2 + 4a + 4}$ при a , равном:
1) 3; 2) 0; 3) -2; 4) -5.

- 1) Если $a = 3$, то $\sqrt{a^2 + 4a + 4} = \sqrt{\dots} = \dots$
2) Если $a = 0$, то \dots
3) Если $a = -2$, то \dots
4) Если $a = -5$, то \dots

3 Поставить в пустой клетке знак $>$ или $<$ так, чтобы получилось верное неравенство:

1) 7,4 7,(4); 2) 3,(51) 3,51;
3) 6,32 6,(3); 4) 2,78 2,(7).

4 Вычислить:

1) $|9| = \dots$ 2) $|-3| = \dots$
3) $|0| = \dots$ 4) $|3,4| = \dots$
5) $\left| -1\frac{1}{7} \right| = \dots$ 6) $|-0,53| = \dots$

5 Решить уравнение:

1) $|x| = 12$; 2) $|x - 1| = 3$.
Ответ. Ответ.

6 Решить неравенство:

1) $|x| \leqslant 4$; 2) $|x| > 4$.
Ответ. Ответ.

7 Вычислить:

1) $\sqrt{7^2} = \dots$ 2) $\sqrt{(-7)^2} = \dots$
3) $\sqrt{2^{10}} = \dots$ 4) $\sqrt{15^4} = \dots$
5) $\sqrt{(-3)^6} = \dots$ 6) $\sqrt{(-2)^8} = \dots$

(II)

8 Сравнить числа: 1) 4,2 и $\sqrt{18}$; 2) $\sqrt{56,2}$ и 7,5.

Сравнить числа 3,3 и $\sqrt{11}$.

► $3,3 = \sqrt{(3,3)^2} = \sqrt{3,3 \cdot 3,3} = \sqrt{10,89}$. Так как $10,89 < 11$,
то $\sqrt{10,89} < \sqrt{11}$, т. е. $3,3 < \sqrt{11}$. ◀

► 1) $4,2 = \dots$ 2) $7,5 = \dots$

9 Показать, что:

1) $\sqrt{17} + \sqrt{19} > 8$; 2) $\sqrt{37} + \sqrt{50} > 13$.

► 1) $\begin{array}{r} \sqrt{17} \\ + \sqrt{19} \\ \hline \end{array} > 4$ 2) \dots

10 Найти два последовательных натуральных числа, между которыми заключено число:

1) $\sqrt{53}$; 2) $\sqrt{133}$.

► 1) $\dots < \sqrt{53} < \dots$ 2) $\dots < \sqrt{133} \dots$ ◀

11* Упростить выражение $\sqrt{a^2 - 4a + 4} + \sqrt{a^2 + 6a + 9}$ при условии:

1) $a < -3$; 2) $-3 < a < 2$; 3) $a \geq 2$.

► $\sqrt{a^2 - 4a + 4} + \sqrt{a^2 + 6a + 9} = |\dots| + |\dots|$.

1) Если $a < -3$, то \dots

2) Если $-3 \leq a < 2$, то \dots

3) Если $a \geq 2$, то \dots ◀

(III)

12 Вычислить:

1) $\sqrt{6^2} = \dots$ 2) $\sqrt{(-6)^2} = \dots$ 3) $\sqrt{3^8} = \dots$

4) $\sqrt{(-3)^6} = \dots$ 5) $\sqrt{(-3)^8} = \dots$ 6) $\sqrt{14^4} = \dots$

13 Сравнить числа:

1) 3,7 и $\sqrt{13}$; 2) 4,3 и $\sqrt{19}$.

- 14** Упростить выражение $\sqrt{4a^2 - 12ab + 9b^2}$, найти его значение при:
1) $a=1, b=2$; 2) $a=-1, b=3$.

**Квадратный корень
из произведения**

§ **23**

I

- 1** Вычислить устно и записать ответ:

1) $4 \cdot \sqrt{25} = \dots$

2) $6 \cdot \sqrt{81} = \dots$

3) $\sqrt{36} \cdot \sqrt{16} = \dots$

4) $\sqrt{49} \cdot \sqrt{64} = \dots$

5) $3 \cdot \sqrt{4} = \dots$

6) $\sqrt{9 \cdot 4} = \dots$

- 2** Вычислить:

1) $\sqrt{27 \cdot 3} = \dots$

2) $\sqrt{32 \cdot 8} = \dots$

3) $\sqrt{6 \cdot 6^3} = \dots$

4) $\sqrt{(-4) \cdot (-4)^5} = \dots$

- 3** Умножить числитель и знаменатель дроби на $\sqrt{3}$:

1) $\frac{2}{\sqrt{3}} = \dots$

2) $\frac{\sqrt{3}}{2} = \dots$

3) $\frac{5\sqrt{3}}{3} = \dots$

4) $\frac{6}{5\sqrt{3}} = \dots$

II

- 4** Вычислить с помощью теоремы о корне из произведения:

1) $\sqrt{36 \cdot 64} = \dots$

2) $\sqrt{0,25 \cdot 144} = \dots$

3) $\sqrt{16 \cdot 25 \cdot 49} = \dots$

4) $\sqrt{0,04 \cdot 225 \cdot 81} = \dots$

- 5** Разложив подкоренное выражение на множители, вычислить:

1) $\sqrt{5184} = \dots$

2) $\sqrt{2304} = \dots$

$$\begin{array}{c|cc} 5184 & 4 \\ 1296 & 4 \\ 324 & 4 \\ 81 & 81 \end{array} \quad 5184 = 64 \cdot 81;$$

3) $\sqrt{7744} = \dots$ 4) $\sqrt{9801} = \dots$

6 Вычислить:

1) $\sqrt{8} \cdot \sqrt{8} = \dots$ 2) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{45} = \dots$
3) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{8} \cdot \sqrt{27} = \dots$ 4) $\sqrt{0,1} \cdot \sqrt{11} \cdot \sqrt{440} = \dots$

7 Вычислить:

1) $\sqrt{(30+12) \cdot (60-18)} = \dots$
2) $\sqrt{55^2 - 44^2} = \dots$
3) $(\sqrt{11} + \sqrt{6})(\sqrt{11} - \sqrt{6}) = \dots$
4) $(2\sqrt{15} + 3\sqrt{17})(3\sqrt{17} - 2\sqrt{15}) = \dots$
5) $(\sqrt{11} - \sqrt{44})^2 = \dots$
6) $(\sqrt{26} + \sqrt{104})^2 = \dots$

8 Упростить:

1) $2\sqrt{72} - \sqrt{50} = \dots$
2) $3\sqrt{75} + 2\sqrt{27} = \dots$
3) $\frac{1}{4}\sqrt{80} + \frac{1}{3}\sqrt{45} - \sqrt{20} = \dots$
4) $\sqrt{24} + \sqrt{54} - \sqrt{96} = \dots$

9 Сравнить числа: 1) 8 и $3\sqrt{7}$; 2) $3\sqrt{3}$ и 2,7.

Сравнить числа 9 и $2\sqrt{21}$.

► $9 = \sqrt{81}$, $2\sqrt{21} = \sqrt{2^2 \cdot 21} = \sqrt{84}$. Так как $\sqrt{81} < \sqrt{84}$,
то $9 < 2\sqrt{21}$. ◀

► 1) \dots
2) \dots

10 Упростить выражение при $a > 0$, $b > 0$:

1) $3a^2\sqrt{\frac{b}{a^3}} - 2b^2\sqrt{\frac{a}{b^3}} = \dots$
2) $\frac{4}{a}\sqrt{a^3b} - \frac{3}{b}\sqrt{ab^3} = \dots$

11* Упростить выражение при $a < 0$, $b < 0$:
 $\frac{2}{a} \sqrt{a^3 b} - \frac{3}{b} \sqrt{ab^3} =$

12 Доказать, что: 1) $(\sqrt{4})^6 = \sqrt{4^6}$; 2) $(\sqrt{7})^5 = \sqrt{7^5}$.

Доказать, что $(\sqrt{9})^4 = \sqrt{9^4}$.

► $(\sqrt{9})^4 = 3^4 = 81$, $\sqrt{9^4} = 9^2 = 81$. ◀

► 1)

2)

13* С помощью формулы $(\sqrt{a})^n = \sqrt{a^n}$, где $a > 0$, n — натуральное число, вычислить:

1) $(\sqrt{2})^8 =$

2) $(\sqrt{11})^4 - (\sqrt{5})^6 =$

14* Упростить выражение

$(\sqrt{18})^3 - (\sqrt{2})^7 =$

III

15 Вычислить:

1) $\sqrt{16 \cdot 81} =$

2) $\sqrt{(-36) \cdot (-49)} =$

3) $\sqrt{16 \cdot 49 \cdot 225} =$

4) $\sqrt{0,36 \cdot 64 \cdot 25} =$

5) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{24} =$

6) $\sqrt{7} \cdot \sqrt{28} =$

7) $\sqrt{7} \cdot \sqrt{7^3} =$

8) $\sqrt{3^3} \cdot \sqrt{3^5} =$

9) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{18} \cdot \sqrt{24} =$

10) $\sqrt{21} \cdot \sqrt{\frac{2}{7}} \cdot \sqrt{\frac{8}{3}} =$

16 Сравнить числа: 1) 7 и $4\sqrt{3}$; 2) $6\sqrt{3}$ и $4\sqrt{7}$.

► 1) 7 =

2) $6\sqrt{3} =$

17 Упростить выражение $\frac{3}{a} \sqrt{a^3 b} - \frac{2}{b} \sqrt{ab^3}$, если $a > 0$, $b > 0$.

►

Квадратный корень из дроби



24

I

1 Вычислить:

$$1) \frac{\sqrt{64}}{4} = \dots$$

$$2) \frac{\sqrt{81}}{3} = \dots$$

$$3) \frac{8}{\sqrt{16}} = \dots$$

$$4) \frac{3}{\sqrt{36}} = \dots$$

$$5) \frac{\sqrt{81}}{\sqrt{9}} = \dots$$

$$6) \frac{\sqrt{144}}{\sqrt{16}} = \dots$$

2 Вычислить:

$$1) \sqrt{\frac{27}{3}} = \dots$$

$$2) \sqrt{\frac{32}{8}} = \dots$$

$$3) \sqrt{\frac{6^5}{6^3}} = \dots$$

$$4) \sqrt{\frac{(-4)^5}{(-4)}} = \dots$$

II

3 С помощью теоремы о корне из дроби вычислить, записав результат в виде десятичной дроби:

$$1) \sqrt{\frac{36}{25}} = \dots$$

$$2) \sqrt{\frac{49}{64}} = \dots$$

$$3) \sqrt{\frac{49}{625}} = \dots$$

$$4) \sqrt{\frac{64}{9}} = \dots$$

4 Вычислить:

$$1) \sqrt{\frac{9}{4}} + \sqrt{9 \cdot 4} = \dots$$

$$2) \sqrt{16 \cdot 49} - \sqrt{\frac{49}{64}} = \dots$$

$$3) 2 \sqrt{\frac{34}{81}} = \dots$$

$$4) \sqrt{4 \frac{33}{64}} = \dots$$

$$5) \frac{\sqrt{32}}{\sqrt{2}} = \dots$$

$$6) \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}} = \dots$$

$$7) \frac{\sqrt{7^5}}{\sqrt{7^3}} = \dots$$

$$8) \frac{\sqrt{(-6)^6}}{\sqrt{(-6)^2}} = \dots$$

5 Упростить:

1) $\frac{\sqrt{8} - \sqrt{2}}{\sqrt{8} + \sqrt{2}} =$

2) $\frac{\sqrt{27} + \sqrt{3}}{\sqrt{27} - \sqrt{3}} =$

3) $\frac{1}{\sqrt{17} - 4} - \frac{1}{\sqrt{17} + 4} =$

4) $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} - \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{\sqrt{7} + \sqrt{3}} =$

6 Упростить выражение $\sqrt{\frac{4a^2 - 4ab + b^2}{a^2 + 6ab + 9b^2}}$ и найти его значение при:

1) $a = -4, b = -8; 2) a = 5, b = -2.$

1)

2)

7 Найти разность между средним арифметическим и средним геометрическим чисел: 1) 3 и 27; 2) $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{27}$.

1) $\frac{3+27}{2} =$

2)

8 Найти произведение двух чисел, если их сумма равна $\sqrt{38}$, а разность равна $\sqrt{18}$.

► $\begin{cases} x+y= \dots, \\ x-y= \dots; \end{cases}$

9 Упростить выражение ($a > 0, b > 0$):

1) $\left(\frac{a}{b} \sqrt{ab} - 2 \sqrt{ab} + b \sqrt{\frac{b}{a}} \right) \cdot \sqrt{ab} =$

2) $(\sqrt{a^5 b} - 2 \sqrt{a^3 b^3} + \sqrt{a b^5}) : \sqrt{ab} =$

10 Вычислить:

$$\begin{array}{ll} 1) \sqrt{\frac{64}{25}} = & 2) \sqrt{20 \frac{1}{4}} = \\ 3) \frac{\sqrt{128}}{\sqrt{2}} = & 4) \sqrt{7 \frac{9}{16} : 0,16} = \\ 5) \frac{\sqrt{56 \cdot 135}}{\sqrt{14 \cdot 15}} = & 6) \sqrt{\frac{3}{8}} \cdot \sqrt{\frac{2}{7}} : \sqrt{\frac{7}{3}} = \end{array}$$

11 Исключить иррациональность из знаменателя:

$$\begin{array}{ll} 1) \frac{6}{\sqrt{7}} = & 2) \frac{2}{\sqrt{8}} = \\ 3) \frac{5}{\sqrt{12} - \sqrt{7}} = & 4) \frac{15}{\sqrt{11} + \sqrt{6}} = \end{array}$$

12 Упростить выражение ($a > 0, b > 0$):

$$\begin{array}{ll} 1) (2\sqrt{a} + 3\sqrt{b})^2 - (3\sqrt{a} + 2\sqrt{b})^2 = & \\ 2) (6\sqrt{a} + 2\sqrt{b})^2 + (2\sqrt{a} - 9\sqrt{b})^2 = & \end{array}$$

IV Квадратные глава уравнения

Квадратное уравнение и его корни



25

I

1 Выписать в ответе номера уравнений, корнем которых является число -4 :

- 1) $-7,5x = -30$; 2) $3\frac{2}{3} + x = 1\frac{2}{3}$;
3) $(x - 4)(x + 4) = 0$; 4) $3\sqrt{x} - 6 = 0$;
5) $5\sqrt{x^2} - 12 = 8$; 6) $\sqrt[3]{2x} + 2 = 0$;
7) $x^2 + 16 = 0$; 8) $2x^2 - x - 28 = 0$.

Ответ:

2 Заполнить пропуск положительным числом:

- 1) $0,64 = (\dots)^2$; 2) $\frac{36}{81} = (-\dots)^2$;
3) $5 = (-\dots)^2$; 4) $8 = (\dots)^2$.

3 Вычислить:

- 1) $\sqrt{144} = \dots$ 2) $\sqrt{0,09} = \dots$
3) $\sqrt{2\frac{7}{9}} = \dots$ 4) $\sqrt{784} = \sqrt{2^4 \cdot 7^2} = \dots$
5) $\sqrt{1089} = \dots$ 6) $\sqrt{576} = \dots$

4 Записать в виде многочлена стандартного вида выражение:

- 1) $2x - 4 + x^2 - 3x - 5x^2 = \dots$
2) $x(x^2 - 2x + 1) - x^3 = \dots$
3) $4(x^2 - 5) - (x - 2)(x + 3) = \dots$

(II)

5 Заполнить таблицу:

№ п/п	Квадратное уравнение	Старший коэффициент	Второй коэффициент	Свободный член
1	$-3x^2 + \frac{3}{4}x - 7 = 0$			
2	$1,5x^2 - 0,1x + \sqrt{3} = 0$	1,5	-0,1	$\sqrt{3}$
3	$-x^2 + 1 = 0$			
4	$\frac{1}{2}x^2 - x = 0$			

6 Данное уравнение привести к виду $ax^2 + bx + c = 0$:

- 1) $x(x-1) + x - 2 = 0$; 2) $(x+3)(x-3) = 2x^2 - 1$;
 3) $(2x-1)^2 = x(x+2) - 3$; 4) $(3x+2)^2 - (2x-1)^2 = 0$.

- 1)
 2)
 3)
 4)

7 Заполнить таблицу:

№ п/п	Уравнение	Уравнение, записанное в виде $ax^2 + bx + c = 0$	Коэффициенты		
			a	b	c
1	$7,3 + \frac{x^2}{2} - \sqrt{2}x = 0$	$\frac{1}{2}x^2 - \sqrt{2}x + 7,3 = 0$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{2}$	7,3
2	$2x - 3x^2 + \frac{1}{2} = 0$				
3	$\frac{-x^2}{3} - 0,5 = 2x$				
4	$1 = -x + x^2$				
5	$3x - x^2 = 0$				
6	$5 = x^2$				

8 Записать в один из столбцов таблицы каждое из уравнений:

- 1) $x^2 = 16$; 2) $x^2 - 20 = 0$; 3) $x^2 + 4 = 0$;
 4) $-\frac{x^2}{7} = 0$; 5) $x^2 - 7 = 0$; 6) $x^2 + \frac{1}{16} = 0$.

Уравнение имеет два корня	Уравнение имеет один корень	Уравнение не имеет корней

9 Решить уравнение:

1) $x^2 = 49$; 2) $x^2 - 6 = 0$;

3) $x^2 + 6 = 0$; 4) $x^2 = 0$;

$$5) |x| = 2; \quad 6)^* |x - 1| = 2$$

10 Решить квадратное уравнение, раскладывая его левую часть на множители:

$$1) \ x^2 + 2x = 0, \quad 2) \ 2x - x = 0,$$

$$x(\dots)=0,$$

$$x_1=0, \quad x_2=\dots$$

3) $5x^2+6x=0,$ 4) $x^2+x+\frac{1}{4}=0,$

$$x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0,$$

$$x_1 = \dots, x_2 = \dots \quad (\dots)^2 = 0,$$

$x = \dots$ ↗

$$5) \ x^2 - 12x + 36 = 0, \quad 6) \ 4x^2 + 12x + 9 = 0.$$

III

11 Выписать номера уравнений, которые можно привести к квадратному:

$$\begin{array}{ll} 1) \ 3x - 2 = x^2 - 5; & 2) \ x^3 - 2x^2 + 5 = x^3; \\ 3) \ 7(x-1) + 2x = 0; & 4) \ (x-1)(x-2) = 3-x \end{array}$$

Ответ: _____

12 Решить уравнение:

1) $x^2 - \frac{4}{9} = 0$;
.....

2) $2x^2 = 50$;
.....

3) $4x^2 + 1 = 0$;
.....

4) $\frac{2}{9}x^2 = 0$;
.....

5) $x^2 + 2x + 1 = 0$;
.....

6) $x^2 - 6x + 9 = 0$
.....

13* Завершить решение уравнения:

1) $x^2 + 6x + 5 = 0$,

2) $x^2 - 12x + 20 = 0$,

$x^2 + 2 \cdot 3x + 3^2 - 3^2 + 5 = 0$,

$x^2 - 2 \cdot 6x + 6^2 - 6^2 + 20 = 0$,

$(x+3)^2 - 4 = 0$,

$(x+3)^2 - 2^2 = 0$,

$(x+3-2)(x+3+2) = 0$,

Ответ. $x_1 = \dots$, $x_2 = \dots$

Ответ. $x_1 = \dots$, $x_2 = \dots$ ◀

Неполные квадратные уравнения

26

1

Записать в клетку неотрицательное число:

1) $\boxed{}^2 = \frac{9}{25}$; 2) $\boxed{}^2 = 0,04$; 3) $\boxed{}^2 = 0$;

4) $\boxed{}^2 = 3$; 5) $\boxed{}^2 = 11$; 6) $\boxed{}^2 = 12$.

2

Записать в клетку неположительное число:

1) $\boxed{}^2 = \frac{9}{25}$; 2) $\boxed{}^2 = 0,04$; 3) $\boxed{}^2 = 0$;

4) $\boxed{}^2 = 3$; 5) $\boxed{}^2 = 11$; 6) $\boxed{}^2 = 12$.

(II)

3 Разложить на множители:

1) $x^2 - 64 = \dots$

2) $y^2 - 0,16 = \dots$

3) $\frac{64}{81} - x^2 = \dots$

4) $x^2 - 5 = \dots$

5) $8x - x^2 = \dots$

6) $2x^3 - \sqrt{3}x = \dots$

4 Перенести все члены уравнения в левую часть и привести подобные слагаемые:

1) $7 - 3x = 2x + 11;$ 2) $x^2 + 2x = 3x - x^2;$

3) $2x - 8 = x^2 - x + 3;$ 4) $15 - 2x^2 - 4x = 12x - 5x^2 + 3.$

5 Умножить обе части уравнения на 2:

1) $0,5x^2 - 1,5x = 0;$ 2) $-\frac{x^2}{2} = 1\frac{1}{2}.$

6 Разделить обе части уравнения на -3 :

1) $-3x^2 = \frac{1}{3};$ 2) $6x^2 - 0,3x = 0.$

(III)

7 Завершить решение уравнения:

1) $10x^2 = 0 \mid : 10;$ 2) $2x^2 = 32 \mid : 2;$

3) $\frac{1}{3}x^2 = 27 \mid \cdot 3;$ 4) $\frac{2}{3}x^2 = \frac{3}{2} \mid \cdot \frac{3}{2};$

5) $5x^2 - \frac{1}{5} = 0$ 6) $-0,1x^2 + 10 = 0$

$$7) 1 = \frac{5-x^2}{3}$$

$$8) \frac{3x^2-10}{4} = \frac{1}{2}$$

8 Завершить решение уравнения:

$$1) 2x^2 + 5x = 3x^2,$$

$$2) 5x^2 - 3x = 2x + x^2,$$

$$2x^2 - 3x^2 + 5x = 0,$$

$$-x^2 + 5x = 0,$$

$$3) (2x-1)^2 - 1 = x(x+2),$$

$$4) (x-3)(x+3) - 2x = 2x^2 - 9,$$

$$4x^2 - 4x + 1 - 1 = x^2 + 2x,$$

9* Для всех числовых значений a решить уравнение:

$$1) ax^2 - 1 = 0; 2) 2x^2 - a = 0.$$

1) Если $a = 0$, то

Если $a > 0$, то

Если $a < 0$, то

2) Если $a = 0$, то

Если $a > 0$, то

Если $a < 0$, то

10 Решить уравнение:

$$1) 9x^2 - 64 = 0,$$

$$2) 2x^2 + 15 = 0,$$

$$3) 0,03x^2 = 27,$$

$$4) x^2 - 9x = 0,$$

$$5) 25x^2 + 49x = 0,$$

$$6) \frac{x^2-7}{6} = \frac{1}{3},$$

11* Найти значение a , при котором любое значение x является корнем уравнения $ax^2=0$.

12* Решить уравнение $ax^2=b$.

При $a=0$

При $a>0$

При $a<0$

Метод выделения полного квадрата

§ 27

I

1 Выполнить возведение в квадрат двучлена:

1) $(x-4)^2 =$

2) $(2x+3)^2 =$

3) $\left(\frac{x}{2}-2\right)^2 =$

4) $(4x+0,5)^2 =$

2 Вставить пропущенное число:

1) $10x = 2 \cdot \boxed{} \cdot x; \quad 2) \quad 2x = 2 \cdot \boxed{} \cdot x; \quad 3) \quad x = 2 \cdot \boxed{} \cdot x;$

4) $\frac{x}{2} = 2 \cdot \boxed{} \cdot x; \quad 5) \quad -3x = -2 \cdot \boxed{} \cdot x; \quad 6) \quad -\frac{2}{3}x = 2 \cdot \boxed{} \cdot x.$

3 Заполнить пустые клетки:

1) $x^2 - 6x + \boxed{} = \left(x - \boxed{}\right)^2;$

2) $x^2 + 2 \cdot \boxed{} \cdot x + \boxed{} = (x + 5)^2;$

3) $4x^2 + 8x + \boxed{} = \left(\boxed{} + \boxed{}\right)^2;$

4) $\frac{1}{9}x^2 - 2x + \boxed{} = \left(\boxed{} - \boxed{}\right)^2.$

4 Решить уравнение:

1) $x^2 = \frac{100}{121}$,

$x_1 = \dots$

$x_2 = \dots$

2) $(x+1)^2 = 9$,

$x+1 = \dots$ или $x+1 = \dots$

$x = \dots$ или $x = \dots$

$x_1 = \dots, x_2 = \dots$

II

5 Завершить решение квадратного уравнения:

1) $x^2 + 8x + 7 = 0$,

$x^2 - 8x = -7$,

$x^2 - 2 \cdot 4 \cdot x + \dots = -7 + \dots$

$(x-4)^2 = \dots$

$x-4 = \pm \dots$

$x-4 = \dots$ или $x-4 = \dots$

Ответ. $x_1 = \dots, x_2 = \dots$

2) $x^2 + 12x + 11 = 0$,

$x^2 + 12x = -11$,

$x^2 + 2 \cdot \dots \cdot x + 36 = -11 + \dots$

$(\dots)^2 = \dots$

$\dots = \dots$

Ответ. \dots

3) $x^2 + 3x - 4 = 0$,

$x^2 + 3x = 4$,

$x^2 + 2 \cdot \dots \cdot x + \dots = 4 + \dots$

$(\dots)^2 = \dots$

4) $x^2 - 5x - 14 = 0$,

\dots

\dots

\dots

Ответ. \dots

Ответ. \dots

6 Заполнить пропуски таким образом, чтобы данное выражение было квадратом суммы или квадратом разности:

1) $x^2 - 4x + \boxed{}$;

2) $x^2 + 20x + \boxed{}$;

3) $x^2 + \boxed{} \cdot x + 36$;

4) $x^2 - \boxed{} \cdot x + 81$;

5) $x^2 + 5x + \boxed{}$;

6) $x^2 - 7x + \boxed{}$.

7 Решить уравнение:

1) $x^2 + 14x + 40 = 0$,

2) $x^2 - 10x - 24 = 0$,

\dots

\dots

\dots

\dots

3)* $x^2 + 3x - 18 = 0$,

4)* $x^2 - 5x - 14 = 0$,

\dots

\dots

\dots

\dots

\dots

\dots

Решение квадратных уравнений

§

28

(I)

1 Заполнить таблицу:

№ п/п	Уравнение $ax^2 + bx + c = 0$	a	b	c	$b^2 - 4ac$	$\sqrt{b^2 - 4ac}$
1	$x^2 - 5x + 4 = 0$	1	-5	4	$(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 4$	2
2	$x^2 + 6x + 8 = 0$					
3	$2x^2 + 3x - 2 = 0$					
4	$-x^2 + 7x + 18 = 0$					
5	$-2x^2 + 7x - 3 = 0$					
6	$\frac{1}{2}x^2 - 2 = 0$					
7	$-3x^2 + \frac{1}{3} = 0$					
8	$5x^2 - x = 0$					
9	$x^2 - 6x + 9 = 0$					

(II)

2 Заполнить таблицу:

№ п/п	Уравнение $ax^2 + bx + c = 0$	$b^2 - 4ac$	Количество корней
1	$x^2 - 2x + 3 = 0$	$(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -8 < 0$	Корней нет
2	$x^2 + 7x - 1 = 0$		
3	$2x^2 - 3x + 5 = 0$		
4	$-3x^2 + x - 2 = 0$		
5	$\frac{1}{2}x^2 - 3x - 6 = 0$		

$$ax^2 + bx + c = 0$$
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

3 Завершить решение уравнения:

1) $x^2 + 4x - 12 = 0,$

► $a = 1, b = 4, c = -12,$

$x_{1,2} =$

2) $x^2 - 4x - 21 = 0,$

$a = \dots, b = \dots, c = \dots.$

$x_{1,2} =$

$x_1 =$

$x_2 =$

$x_1 =$

$x_2 =$

4 Решить квадратное уравнение:

1) $2x^2 + 7x - 4 = 0,$

►

2) $3x^2 - x - 2 = 0,$

►

3) $9x^2 + 6x + 1 = 0,$

►

4) $-4x^2 + 12x - 9 = 0,$

►

5) $5x^2 - 6x + 2 = 0,$

►

6) $3x^2 + 4x + 7 = 0,$

►

5 Решить уравнение:

1) $x(x+2) = 6 + x - x^2;$

►

2) $2x - x^2 - \frac{2-x}{3} = 0;$

►

3) $\frac{x(1-x)}{5} - \frac{1-x}{4} + \frac{x(x-1)}{10} = 0;$

6* Найти значения a , при которых уравнение $ax^2 - x - 10 = 0$ имеет один корень. Для каждого такого a решить данное уравнение.

1) Если $a = 0$, то уравнение принимает вид линейного уравнения $-x - 10 = 0$, имеющего один корень $x = \dots$.

2) Если $a \neq 0$, то данное уравнение является квадратным, имеющим один корень, если $\dots = 0$, т. е. при $a = \dots$.

Корень данного уравнения $x = \dots$.

Ответ. \dots ◀

7* Найти все значения c , при которых уравнение $2x^2 - 3x + c = 0$ имеет:

- 1) один корень;
- 2) два различных корня.

1) Уравнение имеет один корень, если \dots

2) Уравнение имеет два различных корня, если \dots

$$ax^2 + 2mx + c = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-m \pm \sqrt{m^2 - ac}}{a}$$

8 По формуле корней квадратного уравнения с четным вторым коэффициентом решить уравнение:

1) $3x^2 - 4x + 1 = 0;$

2) $5x^2 + 14x - 3 = 0;$

3) $7x^2 + 18x - 9 = 0;$


.....
.....
.....
.....

4) $12x^2 - 16x - 3 = 0;$


.....
.....
.....
.....

(III)

9 Решить квадратное уравнение:

1) $4x^2 - 20x + 25 = 0;$


.....
.....
.....
.....

2) $25x^2 - 10x + 2 = 0;$


.....
.....
.....
.....

3) $12x^2 - 5x - 2 = 0;$


.....
.....
.....
.....

4) $15x^2 + 7x - 2 = 0;$


.....
.....
.....
.....

5) $5x^2 - 3x = 0;$


.....
.....
.....
.....

6) $4x^2 - 9 = 0;$


.....
.....
.....
.....

10 Решить уравнение:

1) $x^2 - 3 = \frac{x}{2} + 2;$


.....
.....
.....
.....

2) $\frac{1-2x}{3} = x^2 - \frac{x}{2};$


.....
.....
.....
.....

3) $2x^2 + x = 1 - \frac{x^2 + x}{2};$


.....
.....
.....
.....

4) $2x^2 - 2x - \frac{1}{2} = \frac{2}{3}x^2 - \frac{x}{3};$


.....
.....
.....
.....

Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета

§ 29

(I)

1 Записать результат деления обеих частей уравнения на число m :

- 1) $2x^2 - 3x + 4 = 0, m = 2;$
- 2) $5x^2 - 10x + 1 = 0, m = 5;$
- 3) $\frac{1}{2}x^2 - 3x - 2 = 0, m = \frac{1}{2};$
- 4) $-\frac{1}{3}x^2 + x - 3 = 0, m = -\frac{1}{3};$

2 Решить квадратное уравнение:

1) $x^2 - 5x + 6 = 0;$

2) $x^2 + 10x + 24 = 0.$

3 Заполнить таблицу:

№ п/п	Уравнение $x^2 + px + q = 0$	p	$\frac{p}{2}$	q	$\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$	Количество корней
1	$x^2 - 6x + 8 = 0$	-6	-3	8	$(-3)^2 - 8 = 1 > 0$	Два
2	$x^2 + 4x + 5 = 0$					
3	$x^2 - 10x + 25 = 0$					
4	$x^2 - 8x + 12 = 0$					
5	$x^2 + 3x + 3 = 0$					
6	$x^2 + 11x + 30 = 0$					

$x^2 + px + q = 0$

$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$

4 Решить приведенное квадратное уравнение:

1) $x^2 - 10x + 21 = 0,$

2) $x^2 + 18x + 80 = 0,$

$\frac{p}{2} = \dots, q = \dots$

$\frac{p}{2} = \dots, q = \dots$

$x_{1,2} = \dots$

$x_1 = \dots$

$x_2 = \dots$

3) $x^2 + 16x + 64 = 0;$

$x_{1,2} = \dots$

$x_1 = \dots$

$x_2 = \dots$

4) $x^2 - 14x + 50 = 0.$

$x_1 + x_2 = -p, x_1 x_2 = q$

- 5** Не решая приведенное квадратное уравнение, корни которого x_1 и x_2 , заполнить таблицу:

№ п/п	Уравнение $x^2 + px + q = 0$	$x_1 + x_2$	$x_1 x_2$
1	$x^2 + 3x - 7 = 0$	-3	-7
2	$x^2 - 4x + 1 = 0$		
3	$x^2 - 99x - 125 = 0$		
4	$x^2 + 33\frac{1}{3}x - 24,5 = 0$		

6*

- Не решая приведенное квадратное уравнение, определить знаки его корней, заполнить таблицу:

№ п/п	Уравнение $x^2 + px + q = 0$	$-p = x_1 + x_2$	$q = x_1 \cdot x_2$	Знак корня, имеющего большую абсолютную величину	Знак корня, имеющего меньшую абсолютную величину
1	$x^2 - 7x + 12 = 0$	7	12	+	+
2	$x^2 + 7x + 12 = 0$				
3	$x^2 + x - 12 = 0$	-1	-12	-	+
4	$x^2 - x - 12 = 0$				
5	$x^2 - 2x - 15 = 0$				
6	$x^2 - 8x - 15 = 0$				
7	$x^2 - 8x + 15 = 0$				
8	$x^2 + 8x + 15 = 0$				

7 Заполнить таблицу, не решая уравнение:

№ п/п	Уравнение $x^2 + px + q = 0$	x_1	x_2
1	$x^2 - 9x + 8 = 0$	1	8
2	$x^2 + 5x + 6 = 0$		-2
3	$x^2 + 4x - 21 = 0$		3
4	$x^2 + 2x - 15 = 0$	-5	

(II)

8 Не решая квадратное уравнение, заполнить таблицу:

№ п/п	Уравнение	p	q	x_1	x_2
1	$x^2 + px + 6 = 0$	5	6	-2	-3
2	$x^2 + px - 8 = 0$		-8	-2	
3	$x^2 + px - 8 = 0$		-8	1	
4	$x^2 + px + 6 = 0$		6	3	
5	$x^2 - 3x + q = 0$	-3		1	
6	$x^2 - 3x + q = 0$	-3		-2	
7	$x^2 - 3x + q = 0$	-3		2	
8	$x^2 + 3x + q = 0$	3		-1	
9	$x^2 + 3x + q = 0$	3		-2	
10	$x^2 + 3x + q = 0$	3		2	

9 Составить приведенное квадратное уравнение, корни которого x_1 и x_2 .

$$x_1 = 5, \quad x_2 = 3; \quad p = -(5+3) = -8, \quad q = 5 \cdot 3 = 15,$$

$$x^2 - 8x + 15 = 0.$$

- 1) $x_1 = -5, \quad x_2 = -3;$
- 2) $x_1 = -2, \quad x_2 = 3;$
- 3) $x_1 = -3, \quad x_2 = 2;$

10*

Заполнить таблицу:

Уравнение	Знак x_1	Знак x_2
$x^2 - 1,5x - 2 = 0$	+	-
$x^2 - 4x + 1 = 0$	+	
$x^2 + 5x + 2 = 0$	-	
$x^2 + 5x - 2 = 0$	-	

11

Подбором найти корни уравнения x_1 и x_2 и заполнить таблицу:

№ п/п	Уравнение	x_1	x_2
1	$x^2 - 5x + 6 = 0$	2	3
2	$x^2 + 5x + 6 = 0$		
3	$x^2 - x - 6 = 0$		
4	$x^2 + x - 6 = 0$		
5	$x^2 + 7x + 10 = 0$		
6	$x^2 - 7x + 10 = 0$		
7	$x^2 - 3x - 10 = 0$		
8	$x^2 + 3x - 10 = 0$		

12

Разложить на множители квадратный трехчлен, используя результаты выполнения задания 11:

- 1) $x^2 - 5x + 6 = (\dots)(\dots)$ 2) $x^2 + 5x + 6 = \dots$
 3) $x^2 - x - 6 = \dots$ 4) $x^2 + x - 6 = \dots$
 5) $x^2 + 7x + 10 = \dots$ 6) $x^2 - 7x + 10 = \dots$
 7) $x^2 - 3x - 10 = \dots$ 8) $x^2 + 3x - 10 = \dots$

13

Разложить на множители квадратный трехчлен:

1) $2x^2 - 5x - 3$; 2) $-3x^2 - x + 2$.

► 1) Найдем корни уравнения $2x^2 - 5x - 3 = 0$:

$x_{1,2} = \dots$

$x_1 = \dots, \quad x_2 = \dots$

Ответ. $2x^2 - 5x - 3 = 2(x \dots)(\dots)$.

2) Найдем корни уравнения $-3x^2 - x + 2 = 0$:

$$x_{1,2} = \dots$$

$$x_1 = \dots, x_2 = \dots$$

Ответ. \dots

14

Заполнить таблицу:

№ п/п	Квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$	Корни уравнения $ax^2 + bx + c = 0$	Разложение трехчлена на множители
1	$5x^2 - 9x - 2$	$x_{1,2} = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 4 \cdot 5 \cdot (-2)}}{2 \cdot 5};$ $x_1 = \frac{9 + 11}{10} = 2,$ $x_2 = \frac{9 - 11}{10} = -\frac{1}{5}$	$5(x - 2)\left(x + \frac{1}{5}\right)$
2	$-5x^2 - 9x + 2$		
3	$\frac{1}{2}x^2 - x - 12$		
4	$-\frac{1}{2}x^2 + 4x - 8$		
5	$\frac{1}{4}x^2 - 3x + 2,25$		
6	$-\frac{2}{3}x^2 - x + 3$		

15

Сократить дробь:

$$1) \frac{x^2 + 3x - 10}{x - 2} = \frac{(\dots)(\dots)}{x - 2} = \dots$$

$$x^2 + 3x - 10 = 0,$$

$$x_1 = \dots, x_2 = \dots;$$

$$2) \frac{x^2 - 25}{x^2 - 4x - 5} = \dots$$

$$3) \frac{9x^2 - 49}{3x^2 - 4x - 7} = \dots$$

16

Разложить на множители:

$$1) x^3 - x^2 - 12x = x(\dots) = \dots$$

$$2) x^4 + 3x^3 - 10x^2 = \dots$$

17

Сократить дробь:

$$1) \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - x - 12} = \dots$$

$$x^2 + x - 6 = 0 \quad x^2 - x - 12 = 0$$

$$x_{1,2} = \dots \quad x_{1,2} = \dots$$

$$x_1 = \dots, x_2 = \dots \quad x_1 = \dots, x_2 = \dots$$

$$2) \frac{x^2 + 3x - 28}{24 - 2x - x^2} = \dots$$

$$x^2 + 3x - 28 = 0 \quad 24 - 2x - x^2 = 0$$

$$x_{1,2} = \dots \quad x_{1,2} = \dots$$

$$x_1 = \dots, x_2 = \dots \quad x_1 = \dots, x_2 = \dots$$

18

Упростить:

$$1) \frac{2}{x^2 - x - 30} + \frac{1}{6 - x} = \frac{2}{(\dots)(\dots)} - \frac{1}{x - 6} = \frac{\dots}{(\dots)(\dots)} = \dots$$

$$2) \frac{4x^2 - 9}{x^2 - x - 12} : \frac{2x + 3}{x^2 - 3x - 4} = \dots$$

19*

Пусть x_1 и x_2 — корни уравнения $x^2 + \sqrt{2}x - 4 = 0$. Не вычисляя корней этого уравнения, найти:

$$1) \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}; \quad 2) x_1^2 + x_2^2.$$

По теореме, обратной теореме Виета, находим: $x_1 + x_2 = -\sqrt{2}$,
 $x_1 \cdot x_2 = -4$.

$$1) \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 + x_1}{x_1 \cdot x_2} = \dots$$

Ответ.

$$2) x_1^2 + x_2^2 = (x_1^2 + 2x_1 \cdot x_2 + x_2^2) - 2x_1 \cdot x_2 = \dots$$

Ответ.

(III)

20 Записать приведенное квадратное уравнение, корни которого x_1 и x_2 :

- 1) $x_1 = -8, x_2 = 0,5$; 2) $x_1 = -3, x_2 = -\frac{1}{3}$;
 3) $x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = 1\frac{1}{2}$; 4) $x_1 = 3\sqrt{2}, x_2 = -\sqrt{2}$.

Ответ. 1) 2)

3) 4)

21 Подбором найти корни уравнения:

- 1) $x^2 - 20x + 19 = 0$: $x_1 =$ $x_2 =$
 2) $x^2 + 38x + 37 = 0$: $x_1 =$ $x_2 =$
 3) $x^2 + 5x - 14 = 0$: $x_1 =$ $x_2 =$
 4) $x^2 - 4x - 21 = 0$: $x_1 =$ $x_2 =$

22 Разложить на множители квадратный трехчлен:

- 1) $x^2 + 2x - 15 =$
 2) $-x^2 + 5x + 24 = - ($ $) =$
 3) $2x^2 + 5x - 12 =$

23 Сократить дробь:

- 1) $\frac{2x^2 - 15x + 7}{2x^2 + 9x - 5} =$
 2) $\frac{x^2 - 12x + 35}{25 - x^2} =$

▶ $2x^2 - 15x + 7 = 0$ $2x^2 + 9x - 5 = 0$

$x_{1,2} =$ $x_{1,2} =$
 $x_1 =$ $x_2 =$ $x_1 =$ $x_2 =$ ◀

.....

5 Решить уравнение $\frac{28}{x^2+x-12} = \frac{x}{x+4} + \frac{1}{x-3}$.

►
$$\frac{28}{(x+4)(x-3)} = \frac{x}{x+4} + \frac{1}{x-3} \quad | \cdot (x+4)(x-3) \neq 0$$

$28 = x(x-3) + x + 4,$

$x_{1,2} = \dots \quad x_1 = \dots \quad x_2 = \dots$

Проверка:

1) $x = -4$ — посторонний корень, так как при $x = -4$ знаменатели первой и второй дробей данного уравнения обращаются в нуль.

2) При $x = 6$ данное уравнение обращается в верное числовое равенство $\frac{28}{6^2+6-12} = \frac{6}{6+4} + \frac{1}{6-3}.$

Ответ. $x = 6.$

6 Решить уравнение $\frac{3}{x-5} - \frac{x}{x+1} = \frac{10}{x^2-4x-5}.$

►
$$\frac{3}{x-5} - \frac{x}{x+1} = \frac{10}{x^2-4x-5} \quad | \cdot (\dots) (\dots) \neq 0$$

$x_{1,2} = \dots$

$x_1 = \dots, x_2 = \dots$

Проверка:

1) \dots

2) \dots

Ответ. \dots

7* Решить уравнение $(x+2)^4 + (x+2)^2 - 12 = 0.$

Пусть $(x+2)^2 = t$, тогда данное уравнение запишется в виде:

$t_{1,2} = \dots \quad t_1 = \dots \quad t_2 = \dots$

1) $(x + 2)^2 =$ 2) $(x + 2)^2 =$

Ответ.

8 Решить уравнение:

$$1) \ x^4 + 2x^2 - 24 = 0,$$

$$2) \quad 9x^4 - 28x^2 + 3 = 0,$$



1. *What is the relationship between the two people in the photo?*



Ответ.

Ответ.

9 Определить, при каких значениях x равны значения выражений $\frac{1}{x-3} + \frac{4}{x^3 - 9x}$ и $\frac{2}{x^2 - 3x}$.





Решение задач с помощью квадратных уравнений



31



1 Записать с помощью всевозможных равенств соотношение между x и y , если:

1) x больше y на 2:

$$x - y = 2, \quad \dots, \quad \dots$$

2) x меньше y на 5:

....., ?

3) x больше y в 3 раза:

..... ?

4) x меньше y в 4 раза:

..... ?

2 Заполнить таблицы:

Натуральное число	Следующее за ним натуральное число	Произведение этих чисел
n	$n + 1$	$n(n + 1)$
$3x$		
$n + 3x$		

Четное число	Следующее за ним четное число	Произведение этих чисел
x		
$6n$		
$x - 6n$		

3 Одна сторона прямоугольника x см, другая — на 5 см больше. Записать выражение для нахождения:

- 1) периметра этого прямоугольника:;
- 2) площади этого прямоугольника:

4 Заполнить таблицу, если известно, что тело движется равномерно и прямолинейно со скоростью v км/ч и за t ч проходит путь s км:

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
v	4		15	2,5	75		x	
t	0,1	8		x		x		$\frac{1}{6}$
s	0,4	640	90		x	18	100	x

5 Один рабочий может изготовить A деталей за 6 ч, другой рабочий A деталей может изготовить за 4 ч. Выразить через A производительность труда:

- 1) первого рабочего: ;
- 2) второго рабочего: ;
- 3) при совместной работе первого и второго рабочих:

- 6** Катер движется по реке от одной пристани до другой по течению реки, а затем возвращается обратно. Заполнить таблицу, учитывая, что скорость течения реки 2 км/ч.

№ п/п	Расстояние между пристанями (км)	Скорость катера в стоячей воде (км/ч)	Скорость катера по течению (км/ч)	Время движения по течению (ч)	Скорость катера против течения (км/ч)	Время движения против течения (ч)
1	48	10	12	4	8	6
2			14	5		
3	35	x				
4					x	3

- 7** Пусть P — производительность труда, A — объем всей выполненной работы, t — время выполнения работы. Выразить каждую из величин A , P и t через две другие.

$$A = P \cdot t, \quad P = \dots, \quad t = \dots$$

- 8** Производительность труда первого рабочего a деталей в час, второго — b деталей в час. Производительность труда рабочих при совместной работе Первый рабочий A деталей изготовит за часов, второй рабочий A деталей изготовит за часов; при совместной работе A деталей оба рабочих изготовят за часов.

(II)

- 9** Найти два последовательных натуральных четных числа, произведение которых равно 168. Заполнив пропуски, составить уравнение по условию задачи и решить его.

Пусть x — первое искомое натуральное четное число, тогда — второе искомое четное число. Так как произведение этих чисел равно 168, можно составить уравнение: Решим это уравнение:

$$x_{1,2} = \dots, \quad x_1 = \dots, \\ x_2 = \dots.$$

Так как по условию задачи x — натуральное число, то $x = \dots$.

Ответ.

- 10** Периметр прямоугольника равен 62 см, а его площадь равна 238 см². Найти стороны прямоугольника. Заполнив пропуски, составить уравнение по условию задачи и решить его.

▶ Пусть x см — длина прямоугольника; так как полупериметр прямоугольника равен см, то его ширина равна см. Зная, что площадь прямоугольника 238 см², можно записать уравнение:

Решим полученное уравнение:

Ответ. 17 см и 14 см. ◀

- 11** Пассажирский поезд проходит в час на 3 км меньше, чем скорый поезд. Расстояние в 810 км скорый поезд проходит на 4,5 часа быстрее, чем пассажирский. Найти скорости пассажирского и скорого поездов. Для решения задачи внести недостающие данные в таблицу.

	v (км/ч)	s (км)	t (ч)
Пассажирский поезд	x	810	←
Скорый поезд		810	↓ на 4,5 ч (больше, меньше)

▶ Составим и решим уравнение:

Ответ. 60 км/ч и км/ч. ◀

- 12** Одна из сторон прямоугольника на 2 см меньше стороны квадрата, а другая — на 4 см больше стороны того же квадрата. Найти сторону квадрата, если площадь прямоугольника равна 40 см².

Ответ.

- 13** Работая вместе, двое рабочих за час изготавливают 30 деталей. Первый рабочий изготавливает 60 деталей на 3 часа быстрее второго. Сколько деталей в час изготавливает каждый рабочий?

▶ Пусть I рабочий изготавливает в час x деталей. Тогда II рабочий за час изготавливает (.....) деталей. На изготовление 60 деталей I рабочий тратит часа, а II рабочий — часа. Так как на изготовление 60 деталей I рабочий тратит на 3 ч меньше, чем II, то можно записать уравнение:

.....

.....

.....

.....

.....

Ответ. 20 и 10 деталей в час. ↗

- 14** Расстояние в 20 км велосипедист преодолел на 3 ч быстрее пешехода. Найти их скорости, если известно, что за час велосипедист преодолевает на 2 км больше, чем пешеход за два часа.

▶

.....

.....

.....

.....

.....

Ответ. ↗

- 15** Мастер и ученик за 4 часа совместной работы изготовили 96 деталей. Сколько деталей в час изготавливает мастер, если на каждую деталь он тратит на 12 минут меньше, чем ученик?

▶

.....

.....

.....

.....

.....

Ответ. ↗

Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени

32

I

- 1** Выяснить, обращает ли пара чисел $x = -2, y = 3$ уравнение (записать «да» или «нет») в верное числовое равенство:
 - 1) $2x - y = -7 \dots$
 - 2) $-3x + 2y = 10 \dots$
 - 3) $\frac{x}{2} + y^2 - 10 = 0 \dots$
 - 4) $xy - 3 + y^2 = 0 \dots$

 - 2** Выписать номер той пары чисел, которая является решением системы уравнений $\begin{cases} x + 2y = 0, \\ -x + y = 3: \end{cases}$
 - 1) $x = 1, y = -1;$
 - 2) $x = 2, y = 1;$
 - 3) $x = 6, y = -3;$
 - 4) $x = -2, y = 1.$
- Ответ.....
- 3** Составить систему двух уравнений с двумя неизвестными, решением которой является пара чисел $x = -3, y = 2$.
 - 1) $\begin{cases} x + y = \dots, \\ xy + y = \dots; \end{cases}$
 - 2) $\begin{cases} \dots, \\ \dots. \end{cases}$

 - 4** Из данного уравнения выразить сначала x через y , затем y через x . Заполнить таблицу:

№ п/п	Уравнение	Выражение x через y	Выражение y через x
1	$x - y = 3$	$x = 3 + y$	$y = x - 3$
2	$2x + y = 1$		
3	$xy - x - 3 = 0$		
4	$\frac{xy}{2} + y = 5$		

- 5** Решить способом подстановки систему линейных уравнений:

- 1) $\begin{cases} 2x - y = 8, \\ 3x - 4y = 7, \end{cases} \dots$

Ответ.

2) $\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 0, \\ x + 2y = 2, \end{cases}$ $x =$

Ответ.



II

6 Решить систему уравнений:

1) $\begin{cases} x + y + 1 = 0, \\ x^2 - y = 13; \end{cases}$

2) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 29, \\ 2x + y - 1 = 0. \end{cases}$

► 1) Выражение $x = -y - 1$ из первого уравнения подставим во второе уравнение $(-y - 1)^2 - y = 13$ и решим его

Ответ. $(3; -4)$, $(-4; 3)$.

2) Из второго уравнения находим $y =$. Выражение y через x подставим в первое уравнение

Ответ. $(-2; 5)$; $(2,8; -4,6)$.

7 Устно найти решение системы и записать ответ:

1) $\begin{cases} x + y = 5, \\ xy = 4; \end{cases}$

2) $\begin{cases} x + y = 1, \\ xy = -12. \end{cases}$

Ответ. 1) $(\dots; \dots)$, $(\dots; \dots)$; 2) $(\dots; \dots)$, $(\dots; \dots)$.

8 Решить систему:

1) $\begin{cases} x^2 - y^2 = 20, \\ x + y = 10; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 61, \\ xy = -30; \end{cases}$ 3) $\begin{cases} \sqrt{x} - \sqrt{y} = 1, \\ x - y = 17. \end{cases}$

► 1) Запишем первое уравнение системы в виде $(x - y)(x + y) = 20$ и подставим в него из второго уравнения $x + y = 10$. Получим $(x - y) \cdot 10 = 20$, откуда $x - y =$.

Итак: $\begin{cases} x - y = \dots, \\ x + y = 10; \end{cases}$

Решая последнюю систему способом сложения, получим $x = \dots$,

$y = \dots$.

Ответ. \dots .

2) Сложив почленно первое уравнение и уравнение, полученное из второго умножением обеих его частей на 2, получим:

$$x^2 + y^2 + 2xy = 61 - 60 \text{ или } (x+y)^2 = 1, \text{ откуда } x+y = \pm 1.$$

Если $x+y=1$, то $y = \dots$.
Подставив это выражение вместо y во второе уравнение исходной системы, получим:

$$x(\dots) = -30.$$

Решим это уравнение:

$$\begin{aligned} &\dots \\ &\dots \\ &\dots \\ &\dots \\ &\dots \end{aligned}$$

Если $x+y=-1$, то $y = \dots$.
Подставив это выражение вместо y во второе уравнение исходной системы, получим:

$$\dots.$$

Решим это уравнение:

$$\begin{aligned} &\dots \\ &\dots \\ &\dots \\ &\dots \\ &\dots \end{aligned}$$

Ответ. $(-5; 6); (6; -5); (5; -6); (-6; 5)$.

3) Пусть $\sqrt{x}=m$, $\sqrt{y}=n$, тогда $x = \dots$, $y = \dots$ и данную систему можно записать в виде $\begin{cases} \dots = 1, \\ \dots = 17. \end{cases}$

Решим эту систему, записав второе уравнение в виде $(\dots) \cdot (\dots) = 17$. Подставив сюда $m-n=1$, получим:
 $m+n = \dots$. Решая систему

$$\begin{cases} m+n = \dots, \\ m-n = \dots, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &\dots \\ &\dots \\ &\dots \\ &\dots \\ &\dots \end{aligned}$$

находим $m = \dots$, $n = \dots$.

Отсюда $x = \dots$, $y = \dots$.

Ответ. \dots 

- 9 Найти катеты прямоугольного треугольника, если известно, что один из них на 7 см больше другого, а гипотенуза этого треугольника равна 13 см.

▶ Пусть x см — больший катет, y см — меньший катет. По условию задачи $\dots = 7$. Согласно теореме Пифагора: \dots

Решение задачи сводится к решению системы $\left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \dots \end{array} \right.$

Решение системы уравнений:

Ответ. 5 см и 12 см. ◀

(III)

10 Решить систему уравнений:

$$1) \begin{cases} y - 2x = 9, \\ x^2 + 2y = 14; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 4x - y + 1 = 0, \\ x^2 + xy + y^2 = 13; \end{cases} \quad 3) \begin{cases} x^2 - y^2 = -24, \\ x - y = 2. \end{cases}$$



V Квадратичная глава функция

Определение квадратичной функции

§ 35

I

1 Функция задана формулой $y = -2x + 3$. Заполнить пропуски:

1) $y(0) = \dots$ $y(1) = \dots$ $y(-2) = \dots$ $y\left(\frac{1}{2}\right) = \dots$

2) $y = 1$ при $x = \dots$

$y = 0$ при $x = \dots$

2 Функция $y(x)$ задана таблицей:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	16	9	4	1	0	1	4	9	16


Заполнить пропуски:

1) $y(-3) = \dots$; $y(0) = \dots$; $y(4) = \dots$

2) $y = 9$ при $x = \dots$ и $x = \dots$

$y = 1$ при $x = \dots$ и $x = \dots$ $y = 0$ при $x = \dots$

3 Функция $y(x)$ задана графиком. Заполнить пропуски:



1) $y(2) = \dots$ $y(0) = \dots$ $y(5) = \dots$

$y(-1) = \dots$ $y(-3) = \dots$ $y(-6) = \dots$

$y(-7) = \dots$ $y(-8) = \dots$ $y(9) = \dots$

2) $y=5$ при $x = \dots$; $y=-3$ при $x = \dots$

$y=2$ при \dots ; $y=0$ при \dots

3) $y > 0$ при \dots

$y < 0$ при \dots

$y \geq 3$ при \dots

4

Выяснить, являются ли указанные в таблице функции квадратичными, записав в ее пустых клетках ответ словами «да» или «нет»:

$y = \frac{x^2}{2}$	$y = x + \frac{1}{x}$	$y = x^2 - x$	$y = x^3 + 4$	$y = -x^2 + 1$	$y = 2x + 3$	$y = \frac{1}{3}x^2 - 5x + 3$
		да				

(П)

5

Функция задана формулой $y = x^2 - 3x + 4$. Выяснить, принадлежат ли графику этой функции точки, указанные в таблице (ответ записать в ее пустых клетках с помощью слов «да» или «нет»):

$(0; 4)$	$(-1; 2)$	$(3; 4)$	$(-4; 0)$	$(5; 44)$	$(-6; 58)$	$\left(\frac{1}{2}; \frac{23}{4}\right)$	$\left(-\frac{1}{2}; \frac{23}{4}\right)$
нет							

6

Записать в пустых клетках таблицы те из чисел $-3, -2, 0, 1, 4$, которые являются нулями квадратичной функции:

Квадратичная функция	$y = x^2 + x$	$y = x^2 + x - 2$	$y = x^2 + 3x$	$y = x^2 - 3x - 4$
Нули функции среди данных чисел	0			

7 Функция задана формулой $y = 3x^2 - x + 1$. Заполнить таблицу:

x	0	-2	4	3	-5	6	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
y						81		

Если x_1 и x_2 — корни уравнения $x^2 + px + q = 0$, то
 $x_1 + x_2 = -p$, $x_1 \cdot x_2 = q$.

8 Указанные в таблице числа x_1 и x_2 — нули квадратичной функции $y = x^2 + px + q$. Заполнить пропуски в таблице соответствующими значениями p и q :

$x_1 = 0$ $x_2 = -1$	$x_1 = 1$ $x_2 = 2$	$x_1 = -3$ $x_2 = 2$	$x_1 = -4$ $x_2 = -3$
$p =$ $q =$	$p = -3$ $q = 2$	$p =$ $q =$	$p =$ $q =$

9 Записать в пустых клетках таблицы координаты точек пересечения графиков данных функций:

Данные функции	$y = x^2 - 4x + 4$ $y = 4x - 8$	$y = x^2 - 2x - 8$ $y = \frac{x^2}{2} - x + \frac{19}{2}$	$y = 2x^2 - 3x + 4$ $y = x^2 - x + 7$	$y = 3x^2 + x + 5$ $y = 5x^2 + 7x - 3$
Координаты общих точек графиков этих функций	(6; 16) (2; 0)			

10 Даны функции $y = \frac{x^2}{3} - 3$, $y = 1 - 3x$, $y = x^3 - x^2 + x$, $y = \frac{x+1}{x}$, $y = 1 + x^2$, $y = 4x^2 - 12x + 9$.

- 1) Подчеркнуть те из них, которые являются квадратичными.
- 2) Найти нули каждой из квадратичных функций.

- 3) Найти $y(-2)$ для каждой из квадратичных функций.

4) Для каждой из квадратичных функций найти те значения x , при которых $y=1$.

11

Найти значение a , при котором графики функций $y=6x^2-2x$ и $y=a-9x$ пересекаются в точке с абсциссой $x=\frac{1}{3}$.



36

Функция
 $y = x^2$

I

1 Функция задана формулой $y=x^2$. Заполнить пропуски:

$$y(0)=\dots \quad y(5)=\dots \quad y(-7)=\dots$$

$$y\left(-\frac{1}{2}\right)=\dots \quad y(0,3)=\dots \quad y(-1)=\dots$$

2 Выяснить, принадлежит ли графику функции $y=x^2$ указанная точка (ответ записать словом «да» или «нет»):

- 1) A (9; -81); 2) B (-9; 81); 3) C $\left(1\frac{1}{2}; 2\frac{1}{4}\right)$; 4) D (-0,1; -0,01).

Ответ. 1) 2) 3) 4)

3 На рисунке даны точки A и B . Построить точки:

1) A' и B' , симметричные данным точкам A и B относительно оси Oy , и записать их


координаты: $A'(\dots; \dots)$;

$B'(\dots; \dots)$;

2) A'' и B'' , симметричные данным точкам A и B относительно оси Ox , и записать их

координаты: $A''(\dots; \dots)$;

$B''(\dots; \dots)$;



- 3) A''' и B''' , симметричные данным точкам A и B относительно начала координат, и записать их координаты: A''' (.....;) ; B''' (.....;) .

II


- 4 Точка A задана своими координатами. Точка B симметрична точке A относительно оси Oy . Точка C симметрична A относительно оси Ox . Точка D симметрична A относительно начала координат. Заполнить таблицу:

Координаты точки A	(-1; 2)	(0; -3)	(2; 4)	(3; -5)	(-5; -1)
Координаты точки B			(-2; 4)		
Координаты точки C			(2; -4)		
Координаты точки D			(-2; -4)		


Выписать координаты той из точек, которая принадлежит графику функции $y = x^2$ (.....;) .

- 5 Используя рисунок, выяснить, является ли функция $y = x^2$ возрастающей на промежутках, указанных в таблице (ответ записать в соответствующих клетках таблицы с помощью слов «да» или «нет»):

(-2; -1)	нет
[-3; 1]	нет
[2; 3]	нет
[0; 2,5]	да
(-2; 3)	нет



- 6** На графике функции $y = x^2$, изображенном на рисунке, найти $y(x_1)$, $y(x_2)$, $y(x_3)$, $y(x_4)$. Сравнить значения аргументов: $x_1 \square x_2$, $x_3 \square x_4$. Сравнить соответствующие значения функций: $y(x_1) \square y(x_2)$, $y(x_3) \square y(x_4)$.



Заполнить пропуски в предложениях:

- 1) Функция $y = x^2$ является на промежутке $x \geq 0$.
- 2) Функция $y = x^2$ является на промежутке $x \leq 0$.

- 7** С помощью рисунка выполнить необходимые построения и заполнить пропуски словами «выше», «ниже», «меньше», «больше».

- 1) При $-5 < x < -3,5$ точки параболы $y = x^2$ лежат


..... точек прямой $y = 9$, следовательно, при $-5 < x < -3,5$ значения

функции $y = x^2$ значений функции $y = 9$.

- 2) При $-1 < x < 2$ точки параболы $y = x^2$ лежат

..... точек прямой $y = 9$, следовательно, при $-1 < x < 2$ значения функци-

ции $y = x^2$ значений функции $y = 9$.



- 8** Выяснить, является ли точка A (см. таблицу) точкой пересечения параболы $y = x^2$ и соответствующей прямой, записав в нижней строке таблицы слово «да» или «нет».

Прямая	$y = x - 1$	$y = -2x + 3$	$y = 3x + 4$	$y = \frac{x}{2} - 1$
Точка A	(2; 1)	(-3; 9)	(4; 16)	(1; 1)
Ответ		да		

9 Отметить на рисунке и выписать:

- 1) абсциссы x_1 и x_2 точек пересечения графиков функций $y = x^2$ и $y = 4$;
- 2) какой-нибудь отрезок на оси Ox , соответствующий тем значениям аргумента, при которых график функции $y = x^2$ расположен: а) выше прямой $y = 4$, б) ниже прямой $y = 4$;
- 3) какой-нибудь отрезок на оси Ox , соответствующий тем значениям аргумента, при которых значения функции $y = x^2$ больше значений функции $y = 4$.


Ответ. 1) $x_1 = \dots$

$$x_2 = \dots$$

$$2) \text{ а)} [\dots; \dots];$$

$$\text{б)} [\dots; \dots];$$

$$3) [\dots; \dots].$$



10 Используя рисунок к предыдущей задаче, выяснить, лежат ли выше прямой $y = 4$ все точки параболы $y = x^2$, принадлежащие соответствующему промежутку. Ответ («да» или «нет») записать в нижней строке таблицы:

(-5; 3)	(1; 5)	(-3; 2)	($\sqrt{5}$; 4)	(-4; - $2\sqrt{2}$)	(-4; $\sqrt{3}$)	($\sqrt{10}$ - 1; 3)
	нет					


11 Заполнить пропуски:

- 1) Точка $A(3; a)$ принадлежит графику функции $y = x^2$ при $a = \dots$.
- 2) Точка $B(a; 11)$ принадлежит графику функции $y = x^2$ при $a = \dots$.
- 3) Точка $C(-\sqrt[5]{5}; a)$ принадлежит графику функции $y = x^2$ при $a = \dots$.


12*

Используя рисунки, найти все значения x , при которых точки графика функции $y = x^2$ удовлетворяют условиям:


1)



2)



3)




- 1) лежат выше прямой $y = 1$:
- 2) принадлежат графику $y = |x|$:
- 3) лежат ниже прямой $y = x$:

(III)

13*

На одном рисунке построить графики функций $y = x^2$ и $y = 5x - 6$. Найти координаты точек пересечения графиков этих функций и изобразить на оси Ox какой-нибудь отрезок, соответствующий тем значениям аргумента, при которых:

- 1) значения функции $y = x^2$ больше значений функции $y = 5x - 6$;
- 2) значения функции $y = x^2$ меньше значений функции $y = 5x - 6$.



**Функция
 $y = ax^2$**



37

I



1 Вычислить:

$$\begin{array}{ll} 1) \left(1 \frac{2}{3}\right)^2 = & 2) \left(-2 \frac{1}{2}\right)^2 = \\ 3) 3 \cdot (-6)^2 = & 4) -4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \\ 5) -\frac{1}{2}(-5)^2 = & 6) -\frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \end{array}$$



2 Построить линии, симметричные данным относительно оси Oy .



3 Построить линии, симметричные данным относительно оси Ox .



4 С помощью графика функции заполнить пропуски.



1) Функция возрастает при $x \dots$

функция убывает при \dots

2) Функция возрастает при \dots

функция убывает при \dots

5 Используя графики данных функций, найти значения аргумента, при которых:


1) значения функций $y = x^2$ и $y = 4x - 3$ равны;

Ответ. $x_1 = \dots$,

$x_2 = \dots$

2) значения функции $y = x^2$ меньше значений функции $y = 4x - 3$.

Ответ. $(\dots; \dots)$.



II

6 Выяснив, принадлежат ли данные в таблице точки графику функции $y = -3x^2$, записать в нижней строке этой таблицы слово «да» или «нет».

$(\sqrt{3}; -9)$	$(\sqrt{2}; 6)$	$(3; -27)$	$(11; -163)$	$(\sqrt{6}; 18)$	$(-9; 243)$
		да			

7

Даны парабола и прямая. Определить направление ветвей параболы, записав в третьей строке таблицы слово «вверх» или «вниз». Выяснить, пересекает ли парабола прямую, и записать в нижней строке слово «да» или «нет».

Парабола	$y = 3x^2$	$y = -2x^2$	$y = \frac{1}{3}x^2$	$y = -\frac{1}{4}x^2$
Прямая	$y = 5$	$y = \frac{1}{2}$	$y = -\frac{1}{4}$	$y = -2$
Направление ветвей параболы		вниз		
Наличие общих точек у параболы и прямой		нет		

8

Заполнить пропуски:

- График функции $y = 4x^2$ получается графика функции $y = x^2$ от оси вдоль оси в раз(а).
- График функции $y = \frac{1}{5}x^2$ получается графика функции $y = x^2$ к оси вдоль оси в раз(а).
- График функции $y = -\frac{1}{3}x^2$ симметричен графику функции относительно оси


9

Функция, график которой симметричен относительно оси Ox графику функции $y = \frac{1}{2}x^2$, задается формулой


10

Функция $y = ax^2$ задана графиком.

a)



б)



1) На каждом из рисунков обвести цветным карандашом ту часть графика, где функция возрастает, а на оси Ox обвести соответствующие значения аргумента.

2) Сравнить значения коэффициента a с нулем.

Ответ. а) $a \square 0$; б) $a \square 0$.

3) Сравнить значения $|a|$ с единицей.

Ответ. а) $|a| \square 1$; б) $|a| \square 1$.

11

Даны функции:

$$y = 0,1x^2, \quad y = -10x^2,$$

$$y = -\sqrt{2}x^2, \quad y = 1,5x^2,$$

$$y = -x^2.$$

Подчеркнуть функции, возрастающие при $x \leq 0$.

12

Используя график функции $y = 4x^2$, найти значения x , при которых:

1) $y < 4$; 2) $y \leq \frac{1}{4}$;

3) $y \geq 9$; 4) $y > 1$.

1) $y < 4$ при


2) $y \leq \frac{1}{4}$ при

3) $y \geq 9$ при

4) $y > 1$ при

13


Записать в нижней строке таблицы координаты точек пересечения параболы и прямой.



Парабола	$y = 2x^2$	$y = -3x^2$	$y = \frac{1}{2}x^2$	$y = -3x^2$
Прямая	$y = 0$	$y = x$	$y = 3x - 4$	$y = 4x + 1$
Координаты точек пересечения параболы и прямой		(0; 0) $\left(-\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right)$		

14

Построить графики функций $y = \frac{1}{2}x^2$ и $y = x + 1\frac{1}{2}$ и с их помощью выяснить, при каких значениях x значения функции $y = \frac{1}{2}x^2$ больше значений функции $y = x + 1\frac{1}{2}$.



15

Найти значение a , при котором парабола $y = ax^2$ и данная прямая пересекаются в точке с абсциссой x_0 . Заполнить пустые клетки таблицы:

Парабола	$y = ax^2$	$y = ax^2$	$y = ax^2$	$y = ax^2$
Прямая	$y = x$	$y = -x$	$y = 2x - 4$	$y = 3 - 4x$
x_0	2	$\frac{1}{3}$	0	-3
a		-3		

(III)

16


Записать в таблицу значение a , если парабола $y = ax^2$ проходит через заданную точку.

Точка	$(-3; \frac{1}{3})$	$(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4})$	$(2; 2)$	$(\sqrt{3}; -1)$
a				

17

С помощью графика функции $y = -\frac{1}{4}x^2$ решить неравенство $-\frac{1}{4}x^2 \geqslant -1$.

Ответ.



18*

Выяснить, является ли заданная квадратичная функция возрастающей или убывающей на указанном в таблице промежутке. Записать в соответствующей клетке таблицы знак \uparrow (возрастание) или \downarrow (убывание) либо слово «нет», если функция не является ни возрастающей, ни убывающей.

Функция	$y = \frac{1}{2}x^2$	$y = -3x^2$	$y = \sqrt{5}x^2$	$y = -3\sqrt{3}x^2$
Промежуток	$(-1; 0)$	$(2; 3)$	$(4; 6)$	$(-3; -\sqrt{2})$
Возрастание или убывание		\downarrow		

19

Построить графики функций:

1) $y = x^2$; 2) $y = 2x^2$; 3) $y = \frac{1}{2}x^2$ — на листочке в клетку с масштабом 1 кл. = 1 ед. Вырезать модели парабол по построенным линиям, наклеить их на картон и использовать в дальнейшем как шаблоны.

Функция



$$y=ax^2+bx+c$$



38

I

- 1 С помощью графика функции $y=ax^2$, изображенного на рисунке, заполнить пропуски:



- a) $a \boxed{} 0$;
б) функция принимает значения при $x \neq 0$;
в) график функции симметричен относительно
г) функция при $x \leq 0$;
функция при $x \geq 0$.
- a) $a \boxed{} 0$;
б) функция принимает значения при $x \neq 0$;
в) график функции симметричен относительно
г) функция при $x \leq 0$;
функция при $x \geq 0$.

- 2 Найти значение выражения $2x^2 - 3x + 1$ при:

- 1) $x=0$
2) $x=1$
3) $x=-1$
4) $x=-2$

3 Записать в виде многочлена стандартного вида:

1) $(x+3)^2 - 5 = \dots$

2) $-3(x-2)^2 + 5 = \dots$

4 Представить в виде квадрата двучлена:

1) $x^2 - 6x + 9 = \dots$

2) $x^2 + 3x + 2,25 = \dots$

5 Выделить полный квадрат:

1) $x^2 - 6x + 7 = \dots$

2) $x^2 - 5x + 7,25 = \dots$

6 $x_0 = -\frac{b}{2a}, y_0 = y(x_0).$

6 Заполнить пустые клетки таблицы.

Парабола	$y = x^2 - 8x + 13$	$y = x^2 + 9x - 3$	$y = -2x^2 + 4x - 5$	$y = -3x^2 + 12x + 7$
Координаты ее вершины		$(-4,5; 57,75)$		

7 Найти координаты вершины параболы и заполнить пустые клетки таблицы.

Парабола	$y = (x+1)^2 - 2$	$y = -2(x-3)^2 - 4$	$y = -3\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 1$	$y = -4(x-2)^2 - 5$
Координаты ее вершины	$(-1; -2)$			

8 Найти на оси Ox точку x_0 , через которую проходит ось симметрии параболы.

$y = x^2 - 4$	$y = x^2 - 4x$	$y = x^2 - 3x + 4$	$y = 2x^2 + 5x + 6$
$x_0 = \dots$	$x_0 = 2$	$x_0 = \dots$	$x_0 = \dots$

II

9 Используя рисунок параболы $y = x^2$, построить с помощью сдвига вправо (влево) график функции:


1) $y = (x - 3)^2;$

2) $y = (x + 3)^2;$


3) $y = x^2 + 4x + 4;$

4) $y = x^2 - 4x + 4.$


1)




2)





3)



4)





10 С помощью графика заполнить пропуски:





1) а) парабола ①, полученная из параболы $y = x^2$ сдвигом на единиц, является графиком функции $y = (\dots)^2$;
 б) функция, заданная графиком ①, возрастает при $x \dots$;
 в) функция, заданная графиком ①, при $x \neq -2,5$ принимает значения.

2) а) парабола ②, полученная из параболы $y = x^2$ сдвигом на единиц, является графиком функции $y = (\dots)^2$;
 б) функция, заданная графиком ②, возрастает при $x \dots$;
 в) функция, заданная графиком ②, при всех действительных значениях x принимает значения.



11 Используя рисунок параболы $y = x^2$, с помощью сдвига вверх (вниз) построить график функции:





- 1) $y = x^2 + 3$; 2) $y = x^2 - 3$; 3) $y = x^2 - 1$; 4) $y = x^2 + 1$.

12 С помощью графика заполнить пропуски:



- 1) а) парабола ①, полученная из параболы $y = \frac{1}{2}x^2$ сдвигом на единиц, является графиком функции $y = \dots$;
 б) функция убывает при $x \dots$;
 в) функция при всех действительных значениях x принимает значения.

- 1) а) парабола ②, полученная из параболы $y = \frac{1}{2}x^2$ сдвигом на единиц, является графиком функции $y = \dots$;
 б) функция возрастает при $x \dots$;
 в) функция на отрезке $[0; 1]$ принимает значения.

13*

Записать в нижней строке таблицы уравнение параболы, полученной из параболы $y = 3x^2$ сдвигом вдоль одной из координатных осей.

Вдоль оси Ox на 4 ед. вправо	Вдоль оси Ox на 1,5 ед. влево	Вдоль оси Oy на 2 ед. вниз	Вдоль оси Oy на 5 ед. вверх
	$y = 3(x + 1,5)^2$		

14*

Записать в нижней строке таблицы уравнение параболы, полученной из параболы $y = -2x^2$ сдвигом вдоль координатных осей.



Вдоль оси Ox на 3 ед. влево и вдоль оси Oy на 0,5 ед. вниз	Вдоль оси Ox на 2 ед. вправо и вдоль оси Oy на 4 ед. вверх	Вдоль оси Ox на 5 ед. влево и вдоль оси Oy на 2 ед. вверх	Вдоль оси Ox на 4 ед. вправо и вдоль оси Oy на 0,4 ед. вниз
	$y = -2(x - 2)^2 + 4$		

15*

На одной и той же координатной плоскости построить графики функций $y = 2x^2$, $y = 2(x + 3)^2$ и $y = 2(x + 3)^2 - 1$, используя шаблон параболы $y = 2x^2$.

16*

На одной и той же координатной плоскости построить графики функций $y = -x^2$, $y = -(x - 2)^2$, $y = -(x - 2)^2 + 4$, используя шаблон параболы $y = x^2$.



17* Записать уравнение параболы, если известны точки ее пересечения с координатными осями. Заполнить таблицу:

С осью Ox ($x; 0$)	$x_1 = 1,$ $x_2 = 2$	$x_1 = 8,$ $x_2 = 3$	$x_1 = -4,$ $x_2 = -5$	$x_1 = -3,$ $x_2 = 5$
С осью Oy ($0; y$)	$y = -4$	$y = 24$	$y = 5$	$y = 3$
Уравнение параболы $y = ax^2 + bx + c$		$y = x^2 - 11x + 24$		

$c = f(0) = \dots$

18* Найти координаты точек пересечения параболы с координатными осями.

Парабола	$y = (x+1)(x-3)$	$y = 3x^2 - 2x$	$y = 4x^2 + 4x + 1$	$y = -8x^2 + 7x - 2$
С осью Ox		$x_1 = 0$ $x_2 = \frac{2}{3}$		
С осью Oy		$y = 0$		

19 Найти координаты вершины параболы, указать направление ветвей параболы (\uparrow или \downarrow). Заполнить таблицу:

Парабола	$y = x^2 - 2x + 7$	$y = -0,5x^2 + 4x - 1$	$y = (x-2)(x+4)$
Координаты вершины параболы	(1; 6)		
Направление ветвей параболы	\uparrow		

- 20** Найти значение k в уравнении параболы, если ей принадлежит точка $A(x_1; y_1)$. Заполнить таблицу:

Уравнение параболы	$y = kx^2 - 5x + 6$	$y = 3x^2 + kx + 4$	$y = 4x^2 - 3x + k$
$A(x_1; y_1)$	(2; 0)	(-1; 9)	(1; 3)
k	1		

Построение графика квадратичной функции

§ 39

I

- 1** Для функции $y = x^2 - 3x + 1$ заполнить таблицу:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y			5					

- 2** Решить уравнение:

1) $x^2 - 2x - 35 = 0$;

Ответ.

2) $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 3 = 0$;

Ответ.

3) $-x^2 + 12x - 36 = 0$;

Ответ.

- 3** Записать координаты точки пересечения графика заданной функции с осью ординат:

1) $y = \frac{1}{8}x + 3$, (.... ;);

2) $y = -5x^2 + 3x - 4$, (.... ;);

3) $y = 2x^3 + 3x^2 - 2x + 7$, (.... ;).

П

4 Заполнить таблицу:


Уравнение параболы	$y = x^2 - 6x + 9$	$y = 2x - x^2$	$y = -2x^2 + 7x + 4$	$y = 3x^2 - 5x + 4$
Координаты вершины параболы	(3; 0)			
Координаты точки пересечения с осью Oy	(0; 9)			
Координаты точек пересечения с осью Ox	(3; 0)			
Эскиз графика				

- 5** На рисунке изображен график квадратичной функции. С помощью графика заполнить пропуски в предложениях.

1) Функция принимает положительные значения при , отрицательные значения при

2) Функция возрастает при и убывает при

3) Функция принимает наименьшее значение, равное, при $x =$



- 6** 1) Построить график функции $y = x^2 - x - 2$, используя схему:

а) вычислить координаты вершины параболы

$$x_0 = \dots, \quad$$

$$y_0 = \dots;$$

б) провести ось симметрии параболы через точку с абсциссой $x_0 = \dots$;

в) найти нули функции:

$$\dots$$

г) найти точку пересечения параболы с осью Oy :


$x = 0, y = \dots$ и координаты точки, симметричной данной $(0; \dots)$ относительно оси симметрии параболы $(\dots; \dots)$.

2) С помощью построенного графика заполнить пропуски в следующих предложениях:

а) функция принимает положительные значения при

б) функция принимает отрицательные значения при

в) функция принимает наименьшее значение, равное, при $x =$



7

1) Построить график функции $y = (x+1)(3-x)$ по схеме, изложенной в задаче 6:

a)

6) _____

B) _____

р) _____

2) Заполнить пропуски в следующих предложениях:
а) функция принимает положительные значения при

б) функция убывает при

в) наибольшее значение функции равно

8

1) Построить график функции $y = -x^2 + 2x - 5$

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com



[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

2) Заполнить пропуски в следующих предложениях:

а) функция принимает положительные значения при


в) функция принимает наибольшее значение, равное ...,

при $x = \dots$




9* Определить знаки коэффициентов уравнения параболы $y = ax^2 + bx + c$, используя рисунки параболы. Заполнить пропуски в таблице знаками « $>$ » или « $<$ ».


1)




2)



3)



4)



Номер параболы	1	2	3	4
Знаки a, b, c	$a \square 0$ $b \square 0$ $c \square 0$			

10* Записать уравнение параболы, симметричной исходной относительно одной из координатных осей. Заполнить таблицу:

Исходная парабола	Парабола, симметрична исходной	
	относительно Oy	относительно Ox
$y = (x - 1)^2 - 2$		
$y = -3(x + 1)^2 + 4$	$y = -3(x - 1)^2 + 4$	$y = 3(x + 1)^2 - 4$
$y = x^2 + 3x - 4$		
$y = -2x^2 + 4x - 5$		



- 11* На одной и той же координатной плоскости построить графики функций:

1) $y = x^2 - 2x$; 2) $y = |x^2 - 2x|$; 3) $y = x^2 - 2|x|$.

- 12* Построить график функции $y = x^2 + 2|x| - 8$ и с его помощью заполнить пропуски:

1) функция принимает отрицательные значения при;

2) функция возрастает при



III


13

Построить график функции $y = x^2 - 2x - 3$ и с его помощью заполнить пропуски в следующих предложениях:

1) функция принимает положительные значения при

2) функция убывает при

3) функция принимает наи.....шее значение, равное, при $x =$




14

Не строя график квадратичной функции, заполнить таблицу:

Квадратичная функция	$y = 4x - x^2$	$y = x^2 + 3x + 4$	$y = -2x^2 + 4x - 6$	$y = 3x^2 - x + 1$
Наибольшее (наименьшее) значение функции		наименьшее $y = 1 \frac{3}{4}$		
Соответствующее значение x		$x = -\frac{3}{2}$		

- 15*** На рисунке изображен график функции $y=f(x)$. С помощью графика заполнить пропуски:



- 1) функция принимает положительные значения при $x \dots$
- 2) функция принимает отрицательные значения при \dots
- 3) функция возрастает при \dots ;
- 4) функция убывает при \dots ;
- 5) функция принимает наибольшее значение, равное \dots , при \dots ;
- 6) функция принимает наименьшее значение, равное \dots , при $x = \dots$.

VI Квадратные неравенства

Квадратное неравенство и его решение



40

I

- 1 Разложить на множители квадратный трехчлен:
- 1) $x^2 - 9x + 18$; 2) $x^2 + 3x + 18$;
3) $2x^2 + x - 6$; 4) $-3x^2 + 10x - 3$.

→
.....
.....
.....

- 2 Изобразить на числовой оси множество решений неравенства:
1) $x - 5 > 0$; 2) $x + 3 < 0$; 3) $x + 4 \geq 0$; 4) $x - 2 \leq 0$.



- 3 Решить систему неравенств:

1) $\begin{cases} x - 3 > 0, \\ x + 2 > 0; \end{cases}$

2) $\begin{cases} x - 3 < 0, \\ x + 2 > 0; \end{cases}$

→ {
.....
.....}

{
.....
.....}

Ответ.

Ответ.

3) $\begin{cases} x - 3 \geq 0, \\ x + 2 \leq 0; \end{cases}$

4) $\begin{cases} x - 3 \leq 0, \\ x + 2 \leq 0. \end{cases}$

→ {
.....
.....}

{
.....
.....}

Ответ.

Ответ.

II

- 4** Выяснить, являются ли данные неравенства квадратными, запи- сав в пустых клетках таблицы слово «да» или «нет»:

$x^2 - 1 < 0$	$3x - 4 > 0$	$3x^2 - 5x + 6 \geq 0$	$x^3 - x \leq 0$
	нет		

- 5** Свести неравенства к квадратным и заполнить пустые клетки таблицы:

$3x^2 > 5x$	$4x^2 - 3 < x$	$(2x - 1)x \geq 3$	$x(x - 1) \leq 2$
		$2x^2 - x - 3 \geq 0$	

- 6** Записать в пустых клетках таблицы те из чисел $-3, -2, 0, 1, 4$, которые являются решениями соответствующего неравенства:

$x^2 - x \leq 0$	$x^2 + 4x - 5 > 0$	$2x^2 + x - 10 < 0$	$x^2 - 2x - 8 \geq 0$
	4		

- 7** Решить неравенство, заполнив пропуски:

1) $(x - 2)(x + 3) < 0$; 2) $(x - 2)(x + 3) \geq 0$.

1) $(x - 2)(x + 3) < 0$,

2) $(x - 2)(x + 3) \geq 0$,

$$\begin{cases} x - 2 < 0, \\ x + 3 > 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ x + 3 \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \dots \\ x \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \dots \\ x \dots \end{cases}$$

Ответ.

Ответ.

- 8** Решить квадратное неравенство $2x^2 - 5x - 3 < 0$, заполнив про- пуски:

$$2x^2 - 5x - 3 = 0, \quad x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 24}}{4} = \frac{5 \pm 7}{4},$$

$$x_1=3, \quad x_2=-\frac{1}{2}; \quad 2x^2-5x-3=2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-3).$$

$$\begin{cases} x + \frac{1}{2} > 0, \\ x - 3 < 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \dots \\ x \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + \frac{1}{2} < 0, \\ x - 3 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \dots \\ x \dots \end{cases}$$

Ответ.

9 Решить квадратное неравенство:

$$1) \ x^2 - x - 2 \geq 0; \quad 2) \ x^2 + x - 12 > 0; \quad 3) \ 3x^2 + 8x - 3 \leq 0.$$

1) $x^2 - x - 2 \geq 0,$

$$x^2 - x - 2 = 0, \quad x_{1,2} = \dots$$

$$x_1 = \dots \quad x_2 = \dots$$

$$x^2 - x - 2 = (x - \dots)(x - \dots).$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \dots \end{array} \right. \qquad \qquad \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \dots \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \dots \end{array} \right. \qquad \qquad \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \dots \end{array} \right.$$

Ответ.

$$2) \ x^2 + x - 12 > 0;$$



.....

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

.....

.....



[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

122

10

Решить квадратное неравенство в случае, когда соответствующее квадратное уравнение имеет равные корни, записав квадратный трехчлен в виде $a(x - x_1)^2$.

► $4x^2 - 12x + 9 \leq 0,$
 $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2, (2x - 3)^2 \leq 0.$

Ответ. $x = \frac{3}{2}$.

1) $4x^2 + 20x + 25 \geq 0;$

Ответ.

2) $25x^2 - 20x + 4 > 0;$

Ответ.

3) $36x^2 + 1 - 12x \leq 0.$

11*

Решить квадратное неравенство в случае, когда соответствующее квадратное уравнение не имеет действительных корней, с помощью метода выделения полного квадрата.

$x^2 - x + 1 > 0$

► $x^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 1 - \frac{1}{4} > 0, (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0.$

Ответ. x — любое действительное число.

1) $x^2 - 4x + 5 \geq 0$;

Ответ.

2) $2x^2 - 4x + 3 > 0$;

Ответ.

3) $3x^2 - 12x + 16 \leq 0$.

Ответ.

III

12. Не решая неравенство $x^2 - 2x \geq 0$, проверить, какие из чисел $-3, -5, 1$ являются решениями этого неравенства.

Ответ.

13. Решить квадратное неравенство:


1) $6x^2 - 5x - 6 > 0$; 2) $9x^2 - 6x + 1 > 0$; 3)* $-2x^2 + 3x - 4 < 0$.

Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции

§ 41

I

- 1 С помощью изображенного на рисунке графика квадратичной функции $y = ax^2 + bx + c$ записать в соответствующих строках таблицы все значения x , при которых эта функция принимает положительные значения, отрицательные значения, значения, равные нулю.



Парабола	1	2	3
$y > 0$	$x \neq -2$		
$y < 0$	нет таких x		
$y = 0$	$x = -2$		

- 2 Заполнить пустые клетки таблицы, указав знаком \uparrow или \downarrow направление ветвей параболы.

Парабола	$y = 1 - x^2$	$y = \frac{x^2}{2} + 3x - 1$	$y = -5x^2 + x + 1$
Направление ветвей параболы		\uparrow	

- 3 Устно найти корни квадратного уравнения:

- 1) $x^2 + 7x - 8 = 0$, $x_1 = \dots$, $x_2 = \dots$
- 2) $x^2 - 6x + 8 = 0$, $x_1 = \dots$, $x_2 = \dots$

(II)

4 Решить квадратное неравенство с помощью эскиза графика квадратичной функции:



1) $4x - x^2 > 0$; 2) $x^2 + 2x - 15 \geq 0$; 3) $3x^2 + 14x \leq 0$.

$2x^2 + x - 6 \geq 0$.

1) Ветви параболы направлены вверх, так как $a = 2 > 0$.

2) $2x^2 + x - 6 = 0$, $x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+48}}{4}$,
 $x_1 = -2$, $x_2 = \frac{3}{2}$.

Ответ. $x \leq -2$, $x \geq \frac{3}{2}$. ◀



5

Решить неравенство с помощью эскиза графика квадратичной функции:

1) $x^2 - 4x + 6 < 0$; 2) $-2x^2 + 5x - 4 \geq 0$;

3) $-3x^2 - 5x \leq 3$; 4) $4x^2 + 5 \leq 8x$.

$$3x^2 - 6x + 4 > 0.$$

1) Ветви параболы направлены вверх, так как $a = 3$, $a > 0$.


2) $3x^2 - 6x + 4 = 0$,

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 12}}{3} \text{ — действительных}$$

корней нет.

$3x^2 - 6x + 4 > 0$ при всех действительных значениях x .

Ответ. x — любое действительное число. ◀



1)

Ответ.


2)

3)

Помощью графика решить неравенство $x^2 + 3|x| - 4 \leq 0$.

6*


С помощью графика функции $y = x^2 + 3|x| - 4$ решить неравенство $x^2 + 3|x| - 4 \leq 0$.



7

Неравенство $|x + 6 - x^2| \leq a$ решено с помощью графика функции $y = |x + 6 - x^2|$. Заполнить пропуски в предложениях так, чтобы они были верными.

- 1) Решением неравенства является отрезок при a
- 2) Решением неравенства являются два отрезка при
- 3) Решением неравенства являются две точки при
- 4) Неравенство не имеет решений при



III

8 Решить неравенство:

$$1) \ x^2 \geqslant 6x + 7;$$

$$2) -2x^2 < -6 + x;$$

$$3) \quad 25x^2 \leq 30x - 9;$$

$$4) \quad 3x^2 + 7 > 8x.$$



Метод интервалов



42

I

1 Заполнить пропуски в предложениях.

1) Функция $y = 2x + 3$ принимает отрицательные значения при $x \dots$; положительные значения при $x \dots$.

2) Функция $y = x + 2$ меняет знак на противоположный в точке с абсциссой $x = \dots$.

2 Определить, положительное или отрицательное значение принимает функция $y = (x - 1)(x + 5)$ в данной точке или на заданном числовом промежутке. Заполнить таблицу:

-7	-2	3	$(-10; -6)$	$(-4; 0)$	$(2; 5)$
	—				

3 Разложить многочлен на множители:

$$1) \ x^3 - x =$$

$$2) \ x^4 - 5x^2 + 4 =$$

4


Решить методом интервалов неравенство:

$$1) x^2 + 3x - 10 < 0; \quad 2) 6x^2 + x - 2 \geq 0; \quad 3) 9x^2 + x < 0.$$

$$(x - 2)(x + 3) > 0$$

Корни уравнения $(x - 2)(x + 3) = 0$

$$x_1 = 2, x_2 = -3.$$



Если $x > 2$ и $x < -3$, то $(x - 2)(x + 3) > 0$.

Ответ. $x < -3, x > 2$. ◀

1) $x^2 + 3x - 10 < 0$

Корни уравнения $x^2 + 3x - 10 = 0$

$$x_1 = -5, x_2 = 2,$$

$$x^2 + 3x - 10 = (\dots)(\dots)$$



Ответ.


II

5

Решить неравенство методом интервалов:

$$1) (x^2 - 9)(x + 1) > 0; \quad 2) (x - 3)(x + 1)(x^2 - 1) < 0;$$

$$3) x^3 - 5x^2 + 6x \leq 0.$$



6 Решить неравенство:

$$1) \frac{(x-2)(x+3)}{(x-4)} \leqslant 0; \quad 2) \frac{x(x+1)(x-1)}{(x+2)(x-2)} \geqslant 0.$$

► 1) Дробь равна нулю при $x_1 = \dots$, $x_2 = \dots$

Дробь не имеет смысла при $x_3 = \dots$

На крайнем правом интервале дробь положительна.

Дробь меняет знак в точках \dots

Ответ. \dots

2) Дробь равна нулю при \dots

Дробь не имеет смысла \dots

Дробь меняет знак в точках \dots

Ответ. \dots

7 Решить неравенство методом интервалов:

$$1) \frac{(x+2)^2}{2x^2+3x-5} < 0; \quad 2) \frac{(x-1)^2(x^2-4)}{x^2-5x-6} > 0.$$

$$\frac{2x^2+5x-12}{x^2+5x-6} \geqslant 0$$

► Разложим числитель и знаменатель на множители:

a) $2x^2+5x-12=0$, $x_{1,2}=\frac{-5 \pm \sqrt{25+96}}{4}$, $x_1=-4$, $x_2=\frac{3}{2}$.

$$2x^2+5x-12=2(x+4)\left(x-\frac{3}{2}\right).$$

$$6) x^2+5x-6=(x+6)(x-1).$$

Отметим на числовой оси точки -6 , -4 , 1 , $\frac{3}{2}$.



Дробь равна нулю при $x=-4$ и $x=\frac{3}{2}$, положительна при $x>\frac{3}{2}$ и меняет знак в отмеченных точках.

Ответ. $x<-6$, $-4 \leqslant x < 1$, $x \geqslant \frac{3}{2}$.

1)

2)



8 Решить неравенство

$$\frac{x^2}{x^2 - 3x} + \frac{5+x}{x} < \frac{x+2}{x-3}.$$

(III)

9 Решить методом интервалов квадратное неравенство
 $21x^2 + 11x - 2 \leq 0.$

10 Решить методом интервалов неравенство

$$\frac{3x^2 - 13x - 10}{2x^2 + 5x - 12} > 0.$$

11* Решить неравенство

$$\frac{3x^2 + 17x - 6}{x^4 - x} \geq 0.$$

Исследование квадратичной функции




§

43*

I

1 Найти нули функции $y = 2x^2 - 5x - 25$.

- 2** По каждому из графиков функции $y = ax^2 + bx + c$, изображенных на рисунке, сравнить с нулем значение выражения $b^2 - 4ac$.



Ответ. а) $b^2 - 4ac \boxed{>} 0$; б) $b^2 - 4ac \boxed{<} 0$; в) $b^2 - 4ac \boxed{=} 0$.

II

- 3** Найти все значения r , при которых квадратичная функция принимает положительные значения при всех действительных значениях x . Заполнить пустые клетки таблицы:

$y = x^2 + rx + 5$	$y = 2x^2 + x + r$	$y = x^2 + rx + 3r$	$y = 3x^2 + rx + 3$
$-2\sqrt{5} < r < 2\sqrt{5}$			

▶ Функция $y = x^2 + rx + 5$ принимает положительные значения при всех действительных значениях x , если $D = b^2 - 4ac \boxed{<} 0$, так как $a = \boxed{1} 0$. Вычислим $D = \dots$. Решим неравенство $D \dots 0$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 4** Найти все значения r , при которых квадратичная функция принимает отрицательные значения при всех действительных значениях x . Заполнить пустые клетки таблицы:

$y = -x^2 + rx - 2$	$y = -3x^2 + 2x + r$	$y = -x^2 + rx - 2r$	$y = -2x^2 - rx - 2$
$-2\sqrt{2} < r < 2\sqrt{2}$			

▶ Функция $y = -x^2 + rx - 2$ принимает отрицательные значения при всех действительных значениях x , если $D = b^2 - 4ac \dots 0$, так как $a = \dots 0$. Вычислим $D \dots$. Решим неравенство $D \dots 0$.

III

5

Вершина параболы $y = x^2 + px + q$ удовлетворяет условиям, указанным в таблице. Выяснив, каким условиям должны удовлетворять числа p и q , заполнить пустые клетки таблицы:

Вершина параболы лежит на оси Ox	Вершина параболы лежит на оси Oy	Вершина параболы лежит в третьем координатном угле

- 1) Вершина параболы $y = x^2 + px + q$ лежит на оси Ox , если ордината вершины $y_0 = -\frac{D}{4} = \dots$, $x_0 = -\frac{p}{2}$ — любое число, значит, $D = p^2 - 4q = \dots$.
- 2) Вершина параболы лежит на оси Oy , если вершины $x_0 = \dots$.

6

Найти все значения b , при которых вершина параболы $y = x^2 + bx - 3$ удовлетворяет условиям, указанным в таблице. Заполнить пустые клетки таблицы:

Вершина лежит справа от оси Oy	Вершина лежит ниже оси Ox	Вершина лежит на оси Ox

- 1) Вершина лежит справа от оси Oy , если вершины параболы $x_0 \square 0$, т. е. $x_0 = \dots$.
- 2) Вершина лежит на оси Ox , если вершины параболы $y_0 \square 0$, т. е. $y_0 = \dots$
-
-
- 3) Вершина лежит на оси Ox , если
-
-

7* Коэффициенты квадратичной функции $y = ax^2 + bx + c$ удовлетворяют условию $c(a+b+c) \leq 0$. Следует ли, что график этой функции имеет хотя бы одну общую точку с осью Ox ?

► Так как $c = y(0)$, а $a + b + c = y(1)$ и $c(a+b+c) \leq 0$, то

$$\text{либо } \begin{cases} y(0) \square 0, \\ y(1) \square 0; \end{cases} \quad \text{либо } \begin{cases} y(0) \square 0, \\ y(1) \square 0; \end{cases} \quad \text{т.е.} \dots$$

Ответ.

8* Определить знак числа c , если график квадратичной функции $y = ax^2 + bx + c$ не пересекает ось Ox и справедливо неравенство $4a - 2b + c < 0$.

► Так как $c = y(0)$, $4a - 2b + c = y(\dots)$, значит, $y(\dots) \square 0$ по условию, то $y(0) \square 0$ и, следовательно, $c \square 0$.

Ответ.

Упражнения для повторения курса алгебры VII—VIII классов



I. Вычисления и преобразования

1 Вычислить:

$$\left(3 \frac{1}{6} - 1 \frac{3}{8}\right) \cdot 1,2 - 3,1^2 =$$

2 Вычислить рациональным способом:

$$1) (2 - 0,01)(2 + 0,01) =$$

$$2) 0,999^2 =$$

3 Упростить:

$$\sqrt{5} + 2\sqrt{80} - \frac{1}{3}\sqrt{45} =$$

4 Упростить выражение, зная, что $x > 0$:

$$3\sqrt{x^3} - \frac{2}{7x}\sqrt{49x^5} + 2\sqrt{\frac{x^4}{4}} =$$

5 Разложить на множители:

$$1) a^5 + a^3 - a^4 - a^2 =$$

$$2) 2a^2 - ab - 6b^2 =$$

6 Выполнить действия:

$$1) (x - y) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) : \frac{x^2 - y^2}{x^2y^2} =$$

$$2) \frac{3a^3b + 3ab^3}{a^4 - b^4} : \frac{6ab}{5a^2 - 5b^2} =$$

II. Уравнения и системы уравнений

1 Решить систему уравнений:

$$\begin{cases} 7x - y = 17, \\ 3x + 2y = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y + 7 = 0, \\ 5x - 4y + 11 = 0. \end{cases}$$

1)

2)

Ответ. 1) 2) □

2 Найти значение x , при котором верно равенство $\sqrt{5 - 6x} = 2$.

3 Решить уравнение:
1) $\frac{1}{4}x^2 - 4x + 16 = 0$; 2) $3x^2 - 2x + 1 = 0$; 3) $2x^2 + 5x - 3 = 0$.

1)

2)

3)

Ответ. 1) 2) 3) □

4 Найти корни уравнения $|2 - 3x| = 5$.

1)

2)

Ответ.

5* Решить уравнение $\frac{4x^2 - 7x - 2}{x^2 - 5x + 6} = 0$.

1)

2)

Ответ. ◀

6* Не решая уравнения $2x^2 - 4x + 1 = 0$, вычислить сумму квадратов его корней.

Ответ. ◀

III. Неравенства и системы неравенств

1 Решить систему неравенств:

$$\begin{cases} 3x - 4 \geqslant 2x - 6, \\ x + 5 > 2x + 2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x + 6 < 3x + 10, \\ 0,3x - 1,3 > 0,2x - 1,1. \end{cases}$$

1)

2)

Ответ. 1)

2) ◀

2 Найти все целые числа, являющиеся решением неравенства $-\frac{7}{4} < \frac{x}{2} \leqslant 0$.

Ответ. ◀

3 Решить квадратичное неравенство:

1) $5x^2 - 3x > 0$; 2) $x^2 - 9 \leq 0$; 3) $3x^2 - 5x + 4 \geq 0$

1) 2) 3)

.....

.....

4 Решить неравенство:

1) $|x - 3| < 8$ 2) $|2 - x| \geq 3$

1) 2)

.....

5 Методом интервалов решить неравенство

$$\frac{(x-5)(3-x)}{x} < 0.$$

.....

Ответ.

IV. Функции

1 Решить графическим методом систему уравнений

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x - y = 5. \end{cases}$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ответ.

2 Данна функция $y(x) = x^2 - 5$.


- 1) Вычислить: $y(0) = \dots$; $y(-3) = \dots$
- 2) Найти значения x , при которых $y(x) = 0$: \dots
- 3) Найти значения x , при которых $y(x) < 0$: \dots

3 Построить график функции:

1) $y = x^2 - 4x - 4$; 2) $y = (x - 3)(x - 1)$.

1) \dots

2) \dots



4 Записать уравнение параболы если известно, что она пересекает ось ординат в точке 3, а ее вершиной является точка $(2; -1)$.

1) \dots

2) \dots

3) \dots

Ответ. \dots

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Неравенства

§ 1. Положительные и отрицательные числа	4
§ 2. Числовые неравенства	7
§ 3. Основные свойства числовых неравенств	11
§ 4. Сложение и умножение неравенств	14
§ 5. Строгие и нестрогие неравенства	17
§ 6. Неравенства с одним неизвестным	20
§ 7. Решение неравенств	23
§ 8. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки	25
§ 9. Решение систем неравенств	30
§ 10. Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль	33

Глава II. Приближенные вычисления

§ 11. Приближенные значения величин. Погрешность приближения	38
§ 12. Оценка погрешности	40
§ 13. Округление чисел	43
§ 14. Относительная погрешность	44

Глава III. Квадратные корни

§ 20. Арифметический квадратный корень	48
§ 21. Действительные числа	50
§ 22. Квадратный корень из степени	53
§ 23. Квадратный корень из произведения	55
§ 24. Квадратный корень из дроби	58

Глава IV. Квадратные уравнения

§ 25. Квадратное уравнение и его корни	61
§ 26. Неполные квадратные уравнения	64
§ 27. Метод выделения полного квадрата	67
§ 28. Решение квадратных уравнений	69
§ 29. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета	73
§ 30. Уравнения, сводящиеся к квадратным	80
§ 31. Решение задач с помощью квадратных уравнений	82
§ 32. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени	87

Глава V. Квадратичная функция

§ 35. Определение квадратичной функции	91
§ 36. Функция $y = x^2$	94
§ 37. Функция $y = ax^2$	99
§ 38. Функция $y = ax^2 + bx + c$	105
§ 39. Построение графика квадратичной функции	112

Глава VI. Квадратные неравенства

§ 40. Квадратное неравенство и его решение	120
§ 41. Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции	125
§ 42. Метод интервалов	129
§ 43*. Исследование квадратичной функции	133

Упражнения для повторения курса алгебры VII—VIII классов	137
---	------------

Учебное издание

**Колягин Юрий Михайлович
Сидоров Юрий Викторович
Ткачёва Мария Владимировна
Фёдорова Надежда Евгеньевна
Шабунин Михаил Иванович**

АЛГЕБРА

Рабочая тетрадь

8 класс

**Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений**

Зав. редакцией *Т. А. Бурмистрова*

Редактор *Л. Н. Белоновская*

Младший редактор *Н. В. Сидельковская*

Художники *В. А. Андрианов, Е. В. Соганова*

Художественный редактор *О. П. Богомолова*

Компьютерная графика: *И. А. Шалеев*

Технические редакторы *Н. А. Киселева, Н. Н. Бажанова,
Е. А. Сиротинская*

Корректоры *Н. В. Белозерова, Н. В. Бурдина, Н. И. Новикова*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—
953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 16.12.09.
Формат 70×100¹/₁₆. Бумага писчая. Гарнитура Школьная. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 5,86. Тираж 10 000 экз. Заказ № 29390.

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение».
127521, г. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д. 41.

Отпечатано в ОАО «Саратовский полиграфкомбинат».
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59. www.sarpk.ru